金 貴 要 略 廣 注

漢張仲景先生金匱要畧廣註下卷 人・ できる かいてい **警悖吐鲫下血崩溃焱血病派證治第十六** 錢塘李 炎珥臣註 同學 者動也有陽氣內衰心下空虚火氣內動而為 預 盗扶提 評-終新章赤 1

当時にする 惕如人 營之血守而不走存於胃中胃氣虚不能攝 悸者有汗吐下後正氣內虚而悸者有**榮**衛 放吐血 則更有 胃吐行濁道 版結代而悸者此 血胸滿瘀血又有源流之别吐血出、將捕之者此驚與悸之所由分也至 心下鼓者有心中澹澹大動者有心 從既出於 **鱽血出於經鲫行清道葢胃者守** 下心屬火惡水 口經者走一經之血走而不 俱屬傷寒而論也若雜 神不自安而

火氣急迎隨經直犯清道由督脈斬開而出於 尸脈動而弱動即為舊弱則為悸 屬相· 則為悸是悸屬乎心也心主血。總以意斷之肝病疾驚點是驚 血與驚悸統聚為 焦宗氣所居是為 以血瘀而魚更滞 膻中穴在兩乳間陷中正當胸中部分此三 洞然 火凡諸見血皆火迎安行故吐寧下血夢 の行きり工品なおりであるとは国家産は取引かるか 中此血疾之所: 胸滿者 一論乎 氣海始因氣滯而血然終 何也難經云氣會脂 血。 ちえ土が スピックラギハ **局局于用也心動** 別以致胸滿也今 屬君火肝藏血 ¢ 0

心下悸者牛夏麻黄先主之 至者 四条。 脈不特見於開上即尺寸兩部亦有動脈 動搖者為動也又云陽動則汗 傷寒論云數脈見 牛夏麻黃丸方 虚故脈弱而無力也 也禁則氣亂故脈動而不寧悸自內楊者也悸 牛夏 下来 The second secon 無頭尾如豆大厥原 出陰動則發熱是動 金ャンスカ 以陰陽相

今止金中六二 師日尺脈浮目睛暈黃衂未止暈黃去目睛慧了知衂 宣水飲於外也 主濕以解水飲於內麻黃吉以泄之能發表出汗以 本經云水停心下甚者則件半夏辛以散之能連胛 調也 李瑋西日傷無脈結代心動悸者主炙甘草湯以潤 經益血復脈通心與此方大異則憑脈與不憑證之 ·殊蛮和产如小豆大飲服三九日照

又目從春至夏甸者太陽從秋至冬烟者陽明全年之 者以肝滅血開竅於目故邸之止與否視目腈之量 邸血出於鼻手太陽經上頤抵鼻爲頤足太陽經從 黄何如黄去睛慧則目得血而能視故鄉止 開之義故春夏鰯者太陽陽明行身之裏經云陽明 身之表內經云太陽為開是春生夏長陽氣在外有 派宣沉而反浮氣升 一門の大 火載除氣不減也目睛暈黃

即家不可汗汗出必額上 眉脈紫色直視不能駒不得 故脈緊急也經云瞳子高者太陽不足戴服者太 虚氣脫也脈者血之府氣者脈所行此以血凸氣竭 胸也所者目轉經云陰氣虚故目不得膜又云陽虚已絕此的血傷陰汗多心陽陰陽兩虛故直視不能 陽明。 為闆是秋飲冬藏陽氣在內有藏之義故秋冬卿者 **鲫家陰血已虧汗出則更丛陽額上爲陽分陷者賜** 四万

新人面無血色無寒熱脈沉弦者蜘脈浮弱手族之絕 病人面無血色無寒熱脈沉弦者蜘脈浮弱手族之絕 神面無血色者脱血之象無寒熱表無邪也沉弦皆 神面無血色者脱血之象無寒熱表無邪也沉弦皆 於俱肺病肺中伏火廹血安行故吐血所謂上氣見 就俱肺病肺中伏火廹血安行故吐血所謂上氣見 如下闡病音也 Ĺ

世血肺虚氣逆金不生水并腎臟亦不能和氣歸原 大刑肺金也忍云數則為其不得則於虚血不歸肝 也則血歸於用。 也則則血歸於用。 也則則血歸於用。 夫吐血欬逆上氣其賑數 四知清京解熱者真屬夢夢 但知清京解熱者真屬夢夢 就出於肺吐出於胃酒性至熱極飲過度則肺胃之 、酒客茲者必致吐血此因極飲過度所致也 、

寒既黄西宁。有印乳乳原原是多一种。

虚且更之 造表問街 府者益気るい

來 寒 口 火之無血 其。因。 異 熟 燥 氣 貌 愈 那。 華: 氣 也內衷。色則無為之人 唇不 感发質 心心脾 煮 血 主 胃的 温∘者, 故不。血。三 胃。胸 T 抵 後大表。則。其 故 口。環。 小而者别。津。色唇、環。唇。瘀 腹。又精故液。紅、痿唇。內。則布大大不不。血也喘病脾。心 也之 布。源、枯寒唇即 故則暴香於中血。交 肋:

病者如熟狀煩滿口乾燥而渴其脈及無熱此為監休 無熱也煩滿者血源經氣不舒燥渴者血源津液不 血瘀內無實熱故外證但如熱狀而其脈不數疾反 是瘀血也當下之 个 字之二 火和者桂枝去芍藥加蜀茶牡蠣龍骨救逆湯主之自 人言我滿以血瘀氣滞效為腹滿耳 桂枝二雨 甘草二雨 生薑三雨 大棗十二 牡蠣五雨 龍骨四兩 大棗十二 牡蠣五雨 龍骨四兩 大棗大二 牡蠣五雨 龍骨四兩 大棗大二 牡蠣五雨 龍骨四兩 大棗大二 牡蠣五雨 龍骨四兩 八來者主此湯方內皆回陽固脫之品也成無已 以不安者主此湯方內皆回陽固脫之品也成無已 桂枝抹逆湯方 一字故葉入驚悸篇中也——一字故葉入驚悸篇中也—— <u>吐血不止者稻葉湯主之</u> 益陰非凸陽所宜也火邪錯逆加蜀添之辛以散之為狂起队不安與桂枝湯解未盡表邪去芍藥以其 陽氣仏脫加龍骨牡蠣之澁以固之本草云湴可去 脫龍骨牡蠣之屬是也 多心陽則心氣虚心惡熱火和內理則心神浮越故 心屬君火肝屬根火几吐血皆火邪趋之也相禁生心屬君火肝屬根火几吐血皆火邪趋之也相禁生心。 人していいます! しました 心屬君火肝屬相火几溫再服養養養養 温

黄土湯方 電中黃土半角 阿膠 白木 附子 黄芩 甘草春三 乾地黄

一血先血後便此近血也赤豆當歸散主之叛惡 血之來路近故先血後便準繩云此由手陽明隨經 近血當歸甘溫和血使氣血各有所歸心主血赤小 確血藥以養不足之真陰故用以溫經逐温 血黄芩清熱入肺經肺與大腸為表裏也附子能引 以火能生土也白术甘草皆培植中土阿膠地黃養 胛胃屬土色黃黃土功能助胃**竈中之土**更得火氣 下行渗入大腸傳於廣腸而下者也大腸在 右七味以水八升煮取三升分溫三服 THE TENED

心氣不足吐血師血爲心湯主之。 豆色亦心之穀也其性下行入XX **葡** 高心湯方 而能排農散血除濕清熱也 ·
莂腸澼

考陰退陽之劑 考陰退陽之劑 家人心為使又能潟肝木不使木旺生火黃黃連苦寒入心為使又能潟肝木不使木旺生火黃 生在行为行名 爽木來

本的原見 **嘔吐暖下利病脈證治第十七章** 逆東垣海藏又以啜為乾嘔陳無棒又以處名 者也王肯堂云或問成無已許學士以嚴為呢 聲乃血病也喧屬陽明有物有聲氣血俱病也 者總司也有太陽陽明少陽之别以其氣血多 此事難知問嘔吐噦胃所主各有經乎答日胃 少而為聲物有無之不同益吐屬太陽有物無 ですり

以歲為呃逆為得經旨也若以歲為乾嘔則疐己詳經文三法正治呃逆之法故取成許二家立已此謂閉口鼻氣使之無息也大驚之亦可 就又三秋傷於濕冬生软嗷則就逆為就嗷無矣若以歲名茲逆按內經三秋傷於濕上逆而與驚與無息其乾嘔能止 巴乎則唬非乾嘔明 末云歲以草刺鼻嚏嚏而已無息而疾迎引之 疑孫真人千金云茲逆者嗽也則後人以欬逆 日歲義具在內經諸家不察再按靈樞雜病篇 利有內因有外因經云腎素

家屬寒者多治宜香溫辛散非癰膿所宜故不可治云熱聚胃口不行故胃脘為癥是胃癰本熱證若嘔

飲家。今下二三 也不渴益支飲屬肺病肺氣不利不能通調水道下 电家本渴学液丛也心下有支飲則胃寒水逆而唱 电家本渴今及不渴者以心下有支飲則胃寒水逆而唱 先唱却渴者此為欲解先渴却唱者為水停心下此屬 飲水過多水停心下此飲家水逆而嘔也本渴而嘔屬胃寒渴則胃中陽氣得復故欲解若先渴則 也宜五苓散即此意水喔者柴前不中兵 **嘔待**療盡則��自愈

受氣於胸中則陽微膈虚者且因虚而致寒故吐為 問日病人脈數數為熱當消穀引食而及吐者何也師 即日病人脈數數為熱當消穀引食而及吐者何也師 無有因熱而數者有因虚而數者經云食入於陰長 氣於陽是胃爲水穀之海得陽盛而消穀今汗多丛 氣於陽是胃爲水穀之海得陽盛而消穀今汗多丛 類腦氣虚而脈數經云邪熱不殺數為客熱不能消 受氣於胸中則陽微膈氣虚脈乃數數為客熱不能消 受氣於胸中則陽微膈氣虚脈乃數數為客熱不能消

野反下之今脈反弦故名日虚金下三·0八 血不足則胸中冷金下三九以後表不属以是外於 脈弦者虚也胃氣無餘朝食暮吐變為胃反寒在於上 可口脈微而數微則無氣無氣則樂虚衆虚則血不足 上者上指胃法富温中始愈反下之則愈虚寒而愈云食不得入是有火也食入反出是無火也此寒在栗土故為胃氣無餘也朝食暮吐變為胃反王太僕 內經云脈弱以滑是有胃氣弦屬肝脈此胃虚木 1

無血生而脈如無無無無無無無無

春吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈緊而濇其病難為陽脈浮而濇浮則為虚虚則傷脾脾傷則不磨朝食然既云胸中冷則溫中之藥自不可少然既云胸中冷則溫中之藥自不可少然既云胸中冷則溫中之藥自不可少。如當歸人然既云胸中冷則溫中之藥自不可少。如當歸人為時人,不可以有人,不可以有人。 治金下四十 則氣外泄而內不克故為虚則傷脾也前三節責之敗陽胃脈也脾胃相為表裏脈在不浮不沉之間浮

嘔 金融東軍 自降故愈。 而胸滿者茱萸湯主之。全下二元活人書云前部猪苓湯後部調胃承氣湯 此屬平常之吐不怡指胃反之 利之使下氣既通上氣服衛而前後何部不利和之則愈全下の五

乾嘔吐涎沫頭痛者茱萸湯主之。金下三二 氣虚而寒邪上窒也人参大棗補虚吳茱萸生薑散 足腹滿者宜下若嘔為氣逆但胸滿不是腹滿此陽 右四味以水五升煮取三升溫服七合日三服 太陰少陰經從足至胸俱不上頭一經並無頭痛證 寒止道。 此仲景治傷寒厥陰證例也乾嘔者有聲無物之謂。 大東十二 吳茱萸一 生薑六兩

傷寒論云病發於陽而反下之熱入因作結朐病至者為結將邪熱乘虚容於心下滿而不痛者痞也經云中氣不足腸為之苦鳴以裏虚也下後胸中寫嘔而腸鳴心下溶者半夏鴻心湯主之。全下三 中為結朐以陷中為陽受氣之分也陰邪傳豪留於於監而下之因作痞成註云下後陽邪傳裹結於期 来 剪以其入 厥陰經故耳餘皆溫補散寒之藥 寒也頭痛者寒氣從經脈上攻也不用桂附而 一出額與督脈會於與故範嘔吐涎沫者裏 而用吳

半夏湯心湯方 半夏湯小湯方 大寨十二 大寨十二 大寨十二 大寨十二 大寨十二 大寨十二 大寨十二 大寨大二 世边級用牛夏乾薑吉以泄熱、角黃連養本 甘以緩脾故用人參甘草大棗 心下為痞以心下為陰受氣之分也

乾唱而利者黃芩加牛夏生臺湯主之金下三三 A black with 甘草大聚緩脾和中此即牛夏鴻心湯例也 入寨故用黃芩撒熱芍薬泄邪牛夏生薑散道止區 此痞氣塞在中焦故令上吃下利然治由那熱乘虚 黃芩加牛夏生薑湯方 右六味。以水一斗。煮取三升去滓。温服一升日再 服夜一服の過中送云為ぼ、矢和西衛王发中馬者是一石之 芍薬二兩 黄芩三雨 甘草 汽南 大棗十二 华夏中升

嘔吐而病在腸上後思水者解急與之思水者浩苓散 諸嘔吐穀不得下者小牛夏湯主之表別全下巨十二 王之。三六二六 **嘔吐穀不下上焦氣逆也小牛夏湯散逆降氣** 猪苓散方

起去江東大学 明子上水 乾薑一原 甘草二兩四遊湯方 整蓋上小便利者寒在下脈弱者無衰於聚後 點治 工用 乾薑一兩 甘草二兩

陽也炙甘草所以稿中。 附子無乾薑不熟又生附配乾薑補中有發所以回 强人可太附子一枚乾薑三兩 小柴胡湯方 - 经主催分温再服 虚也在在是我也是其中都在要自一就中夏生薑以散送上吃人多甘草大棗以我中利 **駸駸乎有漸熱之意又宜和解故用柴胡黄芩以清凡病邪在表則寒宜汗在裏則熱宜下在牛表裏則光溫服一升日三服** 右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三大棗十二 人参三萬 柴胡牛翁 甘草三篇 半夏半升 生臺三南 黄芩三兩

胃灰嘔吐者大半夏湯主之。全下四乙 半夏散逆白雲潤津液而利水敷也。一些則傷脾者可見胃反自屬大虚寒症用人参精虚的論胃及有云膈氣虚胃中虚冷者又云寒在於上藥取二升半溫服一升餘分再服 李升壓日經云嘔家不宜甘味此用白蜜何歟不知 大半夏湯方 右三床以水一斗二升和窗揚之二百四十是煮半夏三升 人参三席 白蜜一升 人参三兩

李重要署 不養 下秦 有一天 以水三升煮取一升分溫再服 有二 味以水三升煮取一升分溫再服 有二 味以水三升煮取一升分溫再服 十 黄 四 兩 十 黄 四 兩 十 章 一 兩 食已即吐者大黄甘草湯主之金下三四 况君以半夏珠辛而止嘔佐以人參氣溫而補中胃 此胃及自屬胖虚經所謂甘味入脾歸其所喜是也 反自立止矣 大黃甘草湯方 大黄四兩

胃及吐而渴欲飲水者茯苓澤渴湯主之。全下三甘草甘以緩急一緩一渴胃氣清而吐止矣 苓澤瀉降氣行飲白术補脾生津此五苓散原方之. 吐而渴者津液丛而胃虚燥也飲水則水停心下茯 右六味以水一斗煮取三升內澤凋再煮取二升柱枝二兩 甘草二兩 生薑四兩 茯苓牛魚 茯苓澤潤湯方 半溫服八合日三服。 **澤**馮四兩 白木三兩

頭痛文站湯主之 宣下三 吐後渴欲得水而貪飲者文蛤湯主之兼主微風熙榮 全置要暑 為通行津液和陽散水之劑,亦用之者桂枝非一於攻表藥也乃徹上下達表裏,不是養散治外有微熱故用桂枝此胃反無表熱而 交蛤湯方 粒五十 甘草 **序黄三**席 生薑春三 石膏五雨 - 11111

使水飲從毛竅中泄去以散水飲於外經云開鬼門。 一愈飲愈渴交蛤味鹹走腎那而勝水氣以利水飲於 性亡津液故貪飲因飲水而停飲於中則津液不布 性大學被放貪飲因飲水而停飲於中則津液不布 大棗十二 乾嘔吐逆吐涎沫牛夏乾薑散主之。今下三 故兼主微風脈緊頭痛。 潔淨府此一方兩得之以內有麻黃生薑等解表藥

項服之 右二味杵為散取方寸七漿水一升半煎取七合。 半夏 乾薑等分 牛夏乾薑散方 東畫等分

然無奈者生薑牛夏湯主之。至下三六 水飲而舒陽氣然待小冷服者恐寒飲固結於中拒陽氣不得伸越之象也生薑半夏辛溫之氣足以散問受氣於胸中胸中似喘不喘等證皆寒飲內蓄而 一升半小冷分四服日三服夜一服止停後服右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取 生薑半夏湯方 生薑汁一升 半夏半升 納反致吐逆今熱藥冷飲下盛之後冷體。

乾嘔、若手足厥者橘皮湯主之金下の四 結難以猝消故分四服使胸中邪氣徐徐散也 猛咬足以止逆降氣嘔吐立除此心中無奈寒飲內 此方與前半夏乾薑湯客同但前溫中氣故用乾薑 既消熱性便發情且不違而致大益此內經之自也 右一味以水七升煮取三升温服一升下咽即愈 橘皮湯方 橘皮四兩 生薑半前

所致故用人参甘東大棗補虚橘皮生薑散逆竹茹村寒疏遊氣而清胃熱用以為君 村寒疏遊氣而清胃熱用以為君 村寒疏遊氣而清胃熱用以為君 一大府氣絕於外者手足不仁全下の六 一大府氣絕於外者手足不仁全下の六 一大府氣絕於外者手足不仁全下の六 一大府氣絕於外者手足不仁全下の六 一大府氣絕於外者手足不仁全下の六 一大府氣絕於外者手足不仁全下の六 一大府氣絕於外者手足不仁全下の六 一大府氣絕於外者手足不仁全下の六 一大府氣絕於外者手足寒上氣脚縮五藏氣絕於內 一大原氣虚寒寒主收引筋失所養故脚縮也五藏屬 一下焦不圖而利不禁手足不仁者下多亡陰血液於 下焦不圖而利不禁手足不仁者下多亡陰血液於 下焦不圖而利不禁手足不仁者下多亡陰血液於

下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反後喘力以陽氣尚存也無解也 自止雖聚熱不死。 數則陽氣得復故為欲止下利忌聚熟雖聚熟不死病不相應故未止也若賬徵弱此脹與病相應者兼虚細經云大則病進又云泄而脈大為難治以脈與沉弦皆屬陰脈下重者陽虚氣不升舉也下利脈宜 利脈沉弦者下重脈大者為未止脈微弱數者為欲脫肌肉榮養無貧故程之不知痛癢也 下利至厥冷無脈氣已脫矣又灸之不溫脈不還反下利有徵熱而渴脈弱者令自愈。全下之二人,是有此陽者為原也。 全下公外 學看此陽者為原也。 全下公外 學看此陽者為原也。 全下公司,有徵熱而渴脈弱者令自愈。全下之二人,不利有徵熱而渴脈弱者令自愈。全下之二人,不利有徵熱而渴脈弱者令自愈。全下之二人,不利至厥冷無脈氣已脫矣又灸之不溫脈不還反下利有徵熱而渴脈弱者令自愈。全下之二

脈與病相應故自愈

下利脈反弦發熱身汗者自愈全一十一 THE PERSON AND PROPERTY. **霊樞云脾病得後與氣則快然如衰氣者失氣也益** 而便腰血是也

膀胱得氣化而出通其前即 中氣虚寒愈甚故腹必脹備表 **可脈反浮數尺中自濇者** 町近の二十十八十二十万次 たっと、二十万次 たっと、二十天人一四 不禁之後馬成南的 脹滿素問 必問 所。利 以。失 全下 也已

格陽於上也夫陽格於上者則陽已虚於下故下利愈也葢下利脈沉遅皆寒氣勝也面赤為戴陽陰盛此證得以鬱胃汗出而解者幸身有微熱一證為可此證得以鬱胃汗出而解者幸身有微熱一證為可 **黎**月汀出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虎 故也金下六三 小利脈沉而遅其人面少赤身有後熱下利清穀者必 而解叉以脈見沉遲裏氣原屬虛寒故得徵默該陽清穀然幸身有微熱故指能變胃汗出令表裏氣和 靈樞一二月中寒則脹滿是也好為獨致等不果以在時間 芜

四逆湯攻表宜桂枝湯四逆湯全下六二 下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜 氣竟絕矣故死 場之 野時 地版 還手足 温陽 氣 新復 也 脈 不 遺 陽 下利 脈 絶 陽 脱 於 裏 也 手 足 厥 冷 陽 脱 於 表 也 写 時 利後脈絕手足厥冷辟時脈還手足温者生脈不還 戰而汗出是也勝而昏憤也 少不至兵敢者是如前時限過一時時之四月之子也多及衛後者は不住不過至人不至兵敢者後在是即引走四行者仍得将行第四面的可也此利後所以及五人以及至 故傷寒論云此爲本虚故當

温服一升服已須臾聚稀粥一升以助藥力溫覆 生薑三兩 大東十二 大東十二 大東大二 桂枝湯方

令一時許追身業業微似有汗益生不可令如水李時珍日仲景治傷寒有汗者為中風用桂枝湯益津液為汗汗即血也在營則為血在衛則為汗恩傷湯而肺實受邪氣其證面赤佛鬱咳嗽有痰喘而胸邊而肺實受邪氣其證面赤佛鬱咳嗽有痰喘而胸邊而肺實受邪氣其證面赤佛鬱咳嗽有痰喘而胸邊而肺實受邪氣其證面赤佛鬱咳嗽有痰喘而胸邊而肺實受邪氣其證面赤佛鬱咳嗽有痰喘而胸邊而肺實受邪氣其證面赤佛鬱咳嗽有痰喘而胸邊而肺實受邪氣其證面赤佛鬱咳嗽有痰喘而胸邊而肺實 CHURCH HARIE 金匠安果 左病 方見永能平恐生乳飲治打白其 補西也使以蓋夷行牌之津液而和营衛也是桂枝内伐肝木以防脾住以芍藥泄水而固脾泄東所以 超叉憑脈之法也。 。 湯雖太陽解肌輕劑實為理脾救肺之藥也不可也也一一 利三部脈皆平按之心下堅者急下之宜大承氛湯。 今三部脈皆平則裏氣不虚可知自宜急下之此怎 自虚虚則補其母故用桂枝甘草外散風邪以救素 下利按之心下堅者實也設或脈見微弱猶未可下。

下利脈原電原及滑者水穀聚於胃中脈經云清為病下利脈反滑當有所去下乃愈宜大承氣湯 脈乃水穀積聚之象脈因裏實氣結經避不通故脈。四分水穀積聚之象脈因裏實氣結經避不通故脈經一經一脈遲尚未可攻以遲爲寒也若遲而滑滑爲陽 無所據者恐虚寒不宜妄投大承氣也正宇泰日脈遲而有力方可用此法若無力而外證遲耳是利未欲止宜急下之。 利脈遲而滑者實也利未欲止急下之宜大承氣湯 食是也故下之愈

之宜大承氣湯 ·利請語者有燥尿也小承氣湯主之。 ·利巳差至其年月日時復發者以病不盡故也當下 いってからつしまた 尚在故當下。 時肝心脾肺腎各值其所傷之臟則病復發也餘邪至其年月日時復發者以春夏秋冬各過其所傷之 經云實則舊語故知有燥屎宜下此主傷寒病言。 小承氣湯方 大黄四雨 厚朴三萬。枳實太者三

是傷寒少陰證以腎爲陰臟位居下部故用卒溫重見傷寒少陰證以腎爲陰臟位居下部故用卒溫重見險,不能隨經以行瘀而不散必致尋竅而出此便膿血人但知為協熱而不知有裏寒者葢寒則血 · 利便膿血桃花湯主之。 桃花湯方 得利則止 右三味以水四升煮取一 赤石脂半節素。 乾薑一兩 升二合去滓分溫二思

熱利下重者白頭翁湯主之。ケー六二 **业最大民** 李時珍日赤石脂之重濟入下焦血分而固脫乾薑 之辛溫暖下焦氣分而補虚粳米之甘溫佐石崩乾 **脂方寸七三脈若一服愈餘勿服** 白頭翁湯方 右三珠以水七升煮米令熟去滓溫七合內赤石 秦皮香三 白頭翁 下下 黄連 黄蘗 華

下利後更煩拨之心下濡者為虚煩也栀子豉湯主之欲堅急食苦以堅之以腎主二便故也 吐生焦虚熱家 方俱苦寒樂寒能勝熱苦以泄熱且厚腸胃經云腎 然煩出於肺病屬上焦栀子入肺經故用栀子豉湯和後更煩者熱也若心下濡則內非實熱故為虚煩 音 温服

下利清敦襄寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之一, 一升半去海分二, 服溫進一服得吐則止, 一升半去海外, 四升先煮栀子得二升半內或煮取, 一利清敦襄寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之之, 一利清敦襄寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之之, 一利清敦襄寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之之, 一利清敦襄寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之之, 一利清敦襄寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之之, 一利清敦襄寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之之, 一利清敦襄寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之之。 全型 是 界 通脈四逆湯方 附子大者 乾 梔子 豉湯方 乾薑三兩强人 甘草一辰

下利清駁即裹寒也外熱者隂盛格陽也汗出而厥右三兩以水三升煮取一升二合去滓分溫再服 氣不相順接便為 厥厥者手足逆冷是也附子益陽 脈行於周身陰陽氣各交接於手足指頭經云陰陽 則亡陽液脫矣湯名通脈四逆者爲四逆以十一 紫参陽方該通知應不持言於 *参半篇、 甘草三兩

氣利訶梨勒散主之、在下二 氣利者下利氣虚下陷而滑脫也訶梨勒 痛紫参主心腹積聚肠胃邪熱佐甘草以和中也 肺與大腸為表裏下利則大腸虚熱上逆廹肺故肺 右一味為散粥飲和頓服 訶梨勒散方 右二味以水五升先煮紫参取二升內甘草煮取 訶梨勒卡枚 升半。分溫三服。

		下更有力也溫胃固腸粥飲乳者假穀氣以助胃頓服者藥炼併
		月頓服者藥炼併

.

という。 **治雅陽濉浸活病脈證第十八** 除毒常內陷淺則從府從陽毒從外泄此輕重 。 收斂而近裏大則氣鼓發而向表深則從隨從 以癰疽並稱不知疽小而深癰大而淺小則氣 則血腐爲膿此奢癰諸病之所由生也今人率 經云諸痛痒瘡皆屬心火葢心主血而惡然恭

THE PARTY 云霄梁之變足生大丁叉云東方魚監之地魚 逆發腸雞不可治驚者死是也有內外因如經 遊發腸雞不可治驚者死是也有內外因如經 成者有婦人產後體虚多臥未經起坐又或坐走以致腸胃傳送不能舒利敗血渴氣壅遏而 為避腫又云腎移寒於脾癰腫少氣脾移寒於 **逆於肉裏乃為雞腫又云三陽為病** 發寒熱下

ではま でくる 傷腸胃或醉飽房勞過傷精力或生冷並進 積腸胃結滞而成者有饑飽労傷擔負重物致 生於內而有證見於外者也生於外者宜按法 治之生於內者勿錯悞處之則無幾矣。 通氣滯而成者此生腸癰之由也浸涤者濕漬 致氣血乖違濕動痰生多致腸胃痞寒運化不 草艱難用力太過産後惡露未歐以致敗血停

難の全下かた 諸浮脈數應當發熱而反灑淅惡寒若有痛處當發其

腸雞之爲病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積 師日諸癰腫欲知有膿無膿以手掩腫上熱者爲有聽 不熟者為無膿。 全服要客———本本条 肠难者熱聚於內則腠理氣血自為壅瘀故皮膚厚 自蘊結故爲無膿 **腫上熱者毒氣已經腐化故爲有膿不熟者毒氣尚** 而庭老如鳞甲之錯雜者然也腹皮急以有雞也添

附子辛熱破廢堅敗醬苦寒入手足陽明經消癰破 血能化膿為水故以為名。然腸癰多生於濕熱意 無故而數哉故知腹內有癰膿也 身有熱者脈因身熱而數若腹無積聚身無熱脈豈 如腫狀膿已成也凡病腹有積聚者脈因積聚而數 右三味杵為未取方寸七以水二升煎減半頓服 小便當下 薏苡附子敗醬散方 意苡仁十分 附子二分 敗醫五分

洪數者膿已成不可下也大黃牡丹湯主之能作句 全面要多 雅者少腹煙落按之即痛如淋小便自調時時發熱腸為引經藥也 腸癰生在少腹故少腹腫痞按之即痛如淋癰在大 故發熱汗出火伏於內故肌表惡寒也發默之族——陽不在膀脫故小便自調熱毒蓄於中而蒸發於外 腸不在膀胱故 全下上一 一之燥禀秋之凉能燥濕清熱入手陽明工

黄 夢 積 熱 以 利 小 怎 解毒而不宜下也 丹湯下其血脈洪敷者膿已成但宜 李瑋西日上 **账遲緊者騰未成以熱** 大黃牡丹湯方 大黃四兩 桃仁鱼 節癰在小腸故云腹內有膿用苡仁 利大便也便此節癰在大腸故云少腹腫痞用大 3.此上 瓜子华升 牡丹皮一兩 达硝三合 上排膿養血清熱 小化故用大黄生

答日若身有瘡被刀斧所傷心血故也会下人 問日寸戶脈微而濇法當亡血若汗出設不汗者云何 ないでする 之脈者總是榮衛虚衰也可以在亦被之不由外因之 火瓜子主潰膿血故可下未成膿之腸癰也 大黃芒硝泄熱桃仁行瘀丹皮逐血痺去血分中代 也設不汗而瘡瘍金瘡雖不以陽而以血亦見微酒 **頓服之有滕當下如無騰當下血** 市五味以水六升煮取一 升去海内达硝再煎沸

新井静合治之為散服方寸之、 村草十八 川椒三牙焼灰存性勿令灰過各 村草十八 川椒三牙除目及開 新金瘡王不留行散主之。

(1) 桑東南根白皮三口拆 王不留行十分八月 蔣建 但服之産後亦可服如風寒柔東根勿取之前三 黄芩 二十分,

走敗血黑能止好血也産後亦可服以産後多瘀血 主絕傷積筋骨桑皮為線可缝金產金擔恐有血豚之患其不留行行血 北北 直接

而生物之本族矣故不可治即上經云病在外者可 所治從四肢流來入口則自外入內那毒漸侵於惠 所治從四肢流來入口則自外入內那毒漸侵於惠 解爲生物之本開竅於口台肌肉而主四肢者也浸 浸洛湾黄連粉王之全下と六 凌浩瑭從口流向四肢者可治從四肢流來入口者不 此方能行於故耳

4			
全国 (文)			性寒味苦寒膀熱苦燥濕故主之性寒味苦寒勝熱若燥濕故主之
			熱若燥濕故土
學			土之工人人黄疸
			入心经

趺蹶手指臂腫轉筋陰豼疝蚘虫病脈凝治第十九 者程脈之海主渗灌谿谷與陽明合於宗筋除 之梅主閵宗筋宗筋主束骨而利機開也看瓜 跌者即背也陽明經動脈處蹶者痿躄之病內 陽総宗筋之會會於氣街而陽明爲之長皆屋 經云治麥獨取陽明何也葢陽明者五萬六府 於帶販而絡於督脈故陽明虛則宗筋群常脈 **經脈有六道即手三隂三陽交接之處如肺手** 不引故足痿不用此跌蹶之所自來也手指气

陰·心包絡脈循臂內入掌中出中指端中衝穴 **穴小腸手太陽脈即起於小指端少澤穴行臂** 其支者别掌中循小指次指出其端三焦手少 手少陰脈行臂内後廉循小指內出其端少值 陽脈即起於小指次指端開衝穴行臂外原心 從腕後次指內廉出其端大腸手腸明脈即起 外後原手指臂腫者或因風火濕痰或因氣虛 太陰脈行臂內前廉出大指端少商穴其支者 於女指端商陽穴循指土廉行臂外前烹手原

所落夜入穴而不溺疝出入上下與狐相類故而溺夜入穴而不溺疝出入上下與狐相類故則入小腹行立則出小腹入囊中因狐晝出穴。 电影音 医男 地 隆狐疝 属肝病 其狀如 医全队 襲傷脾胃所致故轉筋必起於足腓以腓及宗。 胃中冷必吐蚘是蚘證屬隂也然亦有陽語 肝病也肝雖主筋而轉筋則由濕熱寒湿之邪血濇也李時珍日霍亂吐利轉筋皆脾胃病非

经傷也全下之 太陽經行身之背為表陽明經行身之腹為裏凡邪 魚外至皆從太陽經而入是太陽經爲邪氣出入之 趺蹶陽明病也今刺腨入二寸謂太陽經傷者何葢 日病趺蹶其人但能前不能却刺腨入二寸此太陽 黄吐蚘叉大發斑陽毒證口瘡咽痛吐蚘皆以 吐須看兼證何如不可專主胃冷會記一人陽· NA I AN

走足者也又足太陽病風如結腨如裂是為踝厥是足跗足太陽之脈下合膕中貫腨內牖鄉是二經俱絕未當不病哪也靈樞二足陽明之脈循脛外廉下 經未

曾不病贩也靈樞

工足陽明之 門戸也經三三陽病癰腫痿厥腨煩三陽即是太陽 李升墾日按明堂圖腨上有承山飛揚二穴腨下一收持者乎故陽明病而取太陽經穴蓋有由也 主筋今趺蹶能前不能却豈非難經所謂筋緩不能 陽經入者仍從太陽經而出所以泄邪氣於所中之門戶, 膽者即足太陽經之穴刺入二寸使邪氣從太 東下木

轉筋之爲病其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹者 **兩人常以手指臂腫動此人身體關關者黎產甘草湯** 之方缺念不少 **旅為病也藜蘆能吐風痰故主之佐以甘草所以** 寸為附陽穴即陽隔之郄刺之皆治痿厥風痺不仁: 前節病在下部此節病在上部凡濕痰髮滯開節則 此即趺蹶而取太陽經傷之意也 腫風邪襲傷經絡則動手指臂腫動身體關盟動

金國典智 病風種養之意其尿白出雞腸胃中腸胃皆唇陽明指治風病則 云肝之合筋也其畜雞也雞於卦為與秉風木之性風脈也風邪襲傷經絡故臂脚直而轉筋入腹內經 經今主治轉筋者以轉筋起於足腓腓及宗筋皆愿 主治風傷筋者所謂因其氣相感而以意使之者也 上下行者脈來搏指面上直下不和柔也弦脈屬肝 雞尿白散方 一散主之全下と 7. 世上

在一味為末取方寸七以木六合和溫服 中言 右二 界為散取八分一七飲和服日再服室圓亦即蛛片四枚。 桂枝半南 蜘蛛散方 雞尿白

此虫之為病令人吐涎心痛發作有時毒樂不止甘草· 定员巨大方 **ル若弦反洪大故有蚘虫** 經云陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛是也脈反洪大 脈沉也弦屬肝脈其性束急木行乘土故亦主腹痛 胛為至陰其經入腹風寒感之則腹痛陰寒在裏故 是蚘虫上厭動膈與陰寒證不類故主有蚘虫 日病腹痛有虫其脈何以别之師日腹中痛其脈當 桂而枯也然此方萬勿輕試 姊妹有寿主 一項疝疝者肝木之 病桂能伐肝以木得

就得 甘則動其性喜甘故也 胡粉有毒能殺 虫 置粉 故發作有時無泉任脈穴名 靈樞 云姚 動則胃緩胃 **涎也蚘上入膈心在膈** 攬今和煎如薄粥溫服一 右三珠以水三升先煮甘草取二升去洋內粉密 甘草粉蜜湯方 甘草二兩 在一天然去里里 故心痛須臾下膈則痛止 。 升差即止 THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

膈故煩須與復止得食而嘔又煩者或聞食臭出其人或厥者當吐或今病者靜而復時煩此為藏寒或上又 當自此就既不烏梅九主之。全下八二 烏梅克方 烏梅三百 桂枝六兩 黄蘗六兩 細辛六兩 蜜湯中令蚘服毒而死 人参六兩 根四兩 子六两 當歸 乾薑十两 四两

之而蚘厥可愈矣 與蜜杵二千下圓如桐子大先食飲服十九日三 **蒸之五升米下飯熟揚成泥和藥令相得內日中** 宿去核 प्राप्त मिल कर् 拺 腎中間非偏在右側也經又云手少陰脈動 妊娠 者好子也益手少強屬心經心主血脈故耳 腎為命門即女子繋胞之 有無之 瓜經云妹 病胍證治第二 一月始肛足厥性脈養之 法也 也 、懷軀上 月始胞手心主 處殊不知命門在 加上 · 知時時 與血 難經調 聯妊

成手少陽脈養之五 動足太陰脈養之 月毛髮生手太隆

者却一月加吐下者則絕之。全下 師日婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名 妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫治逆 AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA 其氣血多少虛實而調之無無墮胎之患其或其氣血多少虛實而調之無無墮胎之患其或 則下血而墮蓋手足諸經或多無多血或少氣 多血或多氣少血安胎之法宜各按月依經視 至期當養之輕虛實不調則胎亦從此不安甚

又無寒熟故主妊娠桂枝湯用桂枝益衛星安常云八龍食者脈必不平而有寒熱今雖不食及得平脈以奠安不能食者多見世界氣弱也先有他病而渴以養胎則液竭而渴又脾爲坤土厚德載物胎氣賴 脈 要全善日紀之者謂紀上 若桂心肉柱則 臣胎矣为染養祭甘草和中畜其走表與胎在裏無干方染養祭甘草和中畜 主血性脈小弱者血不足也節病證即妊娠惡阻是也寸 液為氣血交理之劑 · 有學亦不盡然。 其自安也訾治一

也桂枝茯苓先主之金下一也下血者後野三月虾也所以血不止者其聚不去故 婦人宿有發病經斷未及三月而得偏下不止胎動在 **大型工作大型** 然又有六月動者前三月經水利時先已成胎即 者經斷未及三月而漏下以致胎氣不安動在磨上 **光有胎者忌漏下恐血下而胎亦下也若宿有癥癌** 美月餘自安土清者最春則終之老,山勿善有喜家可无去之矣。不 一者為機瘤害妊娠六月動者前三月經水利時胎 一婦惡阻病吐愈治愈逆因思仲景絕之之旨遂停

痛故肺動宜行氣胎漏宜清熱 方氏日胎動胎漏皆下血而胎動有腹痛胎漏無腹 妻氏曰凡胎動多當臍今<u>朝在</u>勝上故知是寂也 句即申明前属下不止為 發稿害之故 斷三月郎者迄今六月又動其胎巴成矣其家不去 文程節未及三月其胎已成而得漏下不止是也後 桂枝茯苓先方 茯苓 一去安安大教 方 秦

上角 化联对影形形 腹如扇所以然者子蕨開放也當以附子湯溫其蒎 婦人懷妊六七月販弦祭熟其胎愈脹腹痛惡寒者少 苓淡以渗泄之柱猶主也引導陽氣則癥病已通血 宿血不去則新血不生丹皮桃仁去<u>藏</u>芍藥和荣花 李升望日桃仁丹皮治癥痼不致傷胎即內經有故 無隕亦無隕也之意 止胎安矣 **光不知加至三**克。 右五味末之煉窪和丸如兔屎大毎日食前服一 下下 主

命門為子藏者非也益命門是穴名在腰後兩腎中胞門右二寸為子戸或以命門為女子繋胞之處謂 像痛也少腹如扇子藏開者以肝性疎泄肝血不癒 也肝虚則無血以養胎故胎脹且血脈凝濫不通故 水肝虚血弱則屈非外至而內自生風故發熱惡寒 按子藏即子宫也臍下三寸為關元開元左二寸為 胎將墮也故以附子湯溫其藏。 附有骨第十四椎之兩旁今經文明說少腹如扇者 p,表面的氣因血以養弦屬肝脈又為風脈肝屬風肝水血

金匮要果 妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻歷艾湯主之至師日婦人有漏下者有牛産後因續下血都不紀者有 其在脊後者平此悞也 子藏開則子藏在少腹明矣豈有在少腹者而反謂 歷艾湯方 右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓内 芎藭二兩 甘草二兩 阿膠二兩 下化 方 菜 型 東 三 雨 當歸三前 乾地黃三兩 Paris.

人懷妊腹中方痛當歸芍藥散主之金下五 甘草緩脾經腹痛艾葉入脾肝腎三陰經辛能利寂 苦可疏通故氣血交理而女科止腹痛安胎氣暖子。。。。。。· 宫帶下崩中多用之煮以清酒欲其行也。 也胞阻者足三陰經血不足無以養胎則胞脈阻隔 **産後續下血及妊娠下血有虚實寒熱之異不一** 而上下之氣不通故令腹痛此湯用四物阿膠養血 漏下即妊娠下血脈經以陽不足謂之激經是也半 **廖**今消盡溫服一升日三服不差更作。

妊娠嘔吐不止乾薑人参半夏丸主之金下六 金属地文明四 當歸芍藥散方 白术四兩 茯苓四兩 澤寫年別一當歸三兩 芍薬一兒 芎藭作三兩 The same of the sa

妊娠小便難飲食如故歸母苦參九主之 張元素日妊娠忌半夏薑製則無害矣 夏止嘔散遊 **嘔吐不止此妊娠病惡阻也乾薑溫中人参養胃**半 歸母苦參光方 右三珠末之以生薑汁糊為丸如梧子大飲服十 三九日三服 乾薑人參半夏九方 乾薑一兩 人参一兩 半夏二系

茯苓散主之 金八 姓 城 有 水 氣 身 重 小 便 不 利 麗 浙 惡 寒 起 即 頭 聪 葵 子 金旗野界 原之義。 經以開營利氣使其通調水道下輸膀胱為水出高津液少也當歸辛以潤之苦参苦以泄之貝母入肺、生物於成水及在营的安是山水便難者膀胱氣不化而生物以開始為與其為周若應與山方為數神艺學教室沒接設行先在於其為周若應與山方為數神艺學教室沒接設行先 右三珠末之煉蜜光如小豆大飲服三光加至十 當歸

婦人妊凭宜常服當歸散主之金九 英子 伏苓湯方 當歸散方 **蒸子** 一 茯苓

妊娠養胎白木散主之金丁 金置友客 **載黃苓精熱以和陰陽歸芍芎䓖養血行氣故可常** 滞 **産後**母 虚 是 矣 服四物湯中獨去熟地者恐其泥也昔賢云船前母 即易産胎無疾苦産後百病悉主之右五味杵為散酒飲服方寸七日再服妊娠常服 黄芩都 當歸 芎藭

養胎者胎無病而調養之 養胎者胎無病而調養之不使其損墮也凡胎始於然水服之若嘔以酷漿水服之復不解者小麥汁服之的類別,不服之後渴者大麥汁服之病雖愈服之後更以酷漿水服之後渴者大麥汁服之病雖愈服之後更以酷然水服之後渴者大麥汁服之病雖愈服之後更以酷然水服之。 白木散方 牡蠣 蜀椒去

人工を型 南大田台 血養胎也繁於命 1牡蠣濇精氣以 火經云諸道衝 出水蜀椒溫脾胃而補命門使火門少火生氣也白水補脾胃以培於脾胃坤厚載物也保於肝經蓄 いっていれたしているとはまませんないますとないますることによっている

開元小便微利則愈金土 婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰已下重如有水氣 狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺寫勞宮及 不利故腹滿且不能通調水道故不得小便腰已下 重如有水氣狀而實非水也勞宮在手掌中厥陰 有蜀椒胎寒者宜之是皆可為養胎常服之劑 李瑋西目前當歸散有黃芩胎熱者宜之此白术散 津焲也服之勿置指全方而言。 娠七月屬手太陰肺經養胎肺主氣肺虚則氣滯。

全世史早 大学

治之又云産後一切病多是血虚皆不可發表丹溪云産後當大補氣血為主雖有雜病以末婦人産後病脈證治第二十一 然曹血不去則新血不生故血療而為服

馬之用連蘗不衰太峻削乎然産後多阻於血 質而為閉結至若陰虚生內熱开出喜中昼經 血湯散之者至於竹皮大先之用石膏白頭翁 承氣下之者有用枳實芍藥散通之者有下疾 此血脫者益氣爲格言也本篇產後諸惡有用

便難何謂也師曰新産血虚多汗出喜中風故令病疾 凹日婦人新產有三病一者病產二者病態胃三者大 昔人云中工能補上工能寫自非明醫見與學 治產後者能補不能將元氣尚存養正則邪可 以致草首人命絕不悔咎者其亦可哀也夫 至有氣旣虚而猶云行滯血已脫而尚欲消瘀 自消若用泻不用精刻削和盡不實已先拔矣 透何能借滿殺為陽春利轉圈以應變乎今世

心血復汗寒多故令鬱胃心津 へいれる アレカト 虚心陽故中風病症此來不能養筋也變冒達後血 經云陽氣者精則養神柔則養筋新產血虚多汗表 便難此氣血俱虚皆宜滋陰補陽固表潤裏之劑丰 **暈也經云諸乘寒者則爲厥鬱胃不仁産後亾血復** 此精不能養神也血與汗皆津液也液丛胃燥故 汗陰陽兩虛腠理不密表邪易入故為寒多令變冒 **其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所 5** 1. 液胃燥故大便難全 1

復也大便堅血燥也頭為諸陽之會但頭汗出者派在後雙目脈微弱者榮衛俱虚也嘔不能食胃氣未大承氣湯主之大乘氣湯見腹薦。金之 小柴胡湯主之病解能食七八日更發熱者此為胃質血虚陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食 前節云凸血復汗寒多故令鬱胃則已汗者不可再陽上出也內經云下虚則厥上虚則眩胃即眩也然 然者血虚而厥厥而必見胃家欲解必大汗出以血 下厥孤陽上出故頭汗出所以産婦喜汗出者心陰 and the same of th

不共榮氣和諧故耳復發其汗樂衛和則愈此即因內寒也傷寒論云病自汗出者此爲樂氣和以衛氣 者不令其固表而反欲其汗出乃解哉前云派陽上祭汗胃中冷必吐蚘豈有內寒者不急與溫中汗多外感者必因汗乃解若云內寒則經云病人有寒復 也葢前云寒多令鬱胃者乃汗時復受外感之寒非汗此不忌亡陽之患而云胃家欲解必大汗出者何 出此何以云陽氣獨盛葢所謂孤陽者經云陰在內。 汗而致鬱冒復因汗出而鬱胃解之意也可見寒從 0 -----

陽之守也今陰虚陽無所麗故為所謂陽所謂陽氣傷 一門氣盛非正氣盛也氣便整嘔不能食者小柴胡湯和 在者指衛氣為寒邪所束怫鬱在表不得發越乃衛 中邪氣盛非正氣盛也氣便整嘔不能食者小柴胡湯和 是也大承氣湯下之然必在病解能食者小柴胡湯和 是也大承氣湯下之然必在病解能食者小柴胡湯和 是也大承氣湯下之然必在病解能食者小柴胡湯和 是也大承氣湯下之然必在病解能食者小柴胡湯和 是也大承氣湯下之然必在病解能負養者, 是也大承氣湯下之然必在病解能負養者, 是也大承氣湯下之然必在病解能負養者, 是也大承氣湯下之然必在病解能 明病蒸蒸蒸蒸煮 之時更發熱者此為胃實所謂陽明病蒸蒸蒸蒸煮 之時, 是也大承氣湯下之然必在病解能 明病蒸蒸蒸蒸煮 之時, 是也大承氣湯下之然必在病解。 是也大承氣湯下之然必在病解。 是也大承氣湯下之然必在病解。 是一大水氣湯。 是一大水氣。 是一大水。 是一大、 是一、 是一大水。 是一大水。 是一大水。 是一大水。 是一、 是一、

虚勞不足害有金丁之。。 2000年以未及并治虚虚勞不足害有金丁之 産後腹痛煩滿不得臥枳實芍樂散主之。全五 大五七五下五下5 **産後腹中疔痛當歸生薑羊肉湯主之并治腹中寒疝** 之藥也 勞不足之病治寒疝者疝從寒生三珠皆溫養氣血 腹痛煩滿胃家實也經云胃不和則趴不安 一法萬勿輕試也 1 11:34

痒瘡皆屬 心火是也 土中海木使漏止满消則臥安矣又芍薬泄邪熱枳 枳實下氣寬腸燒黑則入血分为藥安脾通壅能於 **日産後腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為** 粥下之。 右二味杵爲散服方寸七日三服并主癰腺以麥 枳實芍葉散方 枳實焼今黑。 芍藥各等

産後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡了 ションロンログ 大黄苦以 經水不利要惟血實者宜之 八合頓服之新血下如豚 右三味未之煉蜜和爲四九以 瘀血湯方 大黄三兩 為實桃仁苦以 一學之一學院村文 川湯主ク 血虚者忌服 永血、 Î 亦主經水不利 足枚 个大便 九取

也。全之 則 結在膀胱此太明 必結於此則堅 證也少腹堅痛 證也。 **頁證因古人文法錯綜** 陽。其熱 明·人在 節具兩證在內 太陽蓋血證也 血也 飞 **聚血少腹為肝經過** 飲難辨也無太陽報 肝經部分故意太陽證謂無 者太 脈 明

AND BLANK 問乾嘔汗出雖久陽旦湯證績在耳可與陽旦湯 **连後風積之數十日不解頭徵** 也又云發熱者尤當先解表 明府病也宜大承氣湯以下胃實故煩躁不能食病在陽而不在除。 可安議攻下哉必認證果宜。 **按經云陽明病不能食攻其熱必處以胃中虚冷** 一湯即桂枝湯也産後氣血兩虛雖中風至十 陽明旺於申酉戌日晡是陽明向旺 これのことの のない とうない 大学の 方可用此 痛惡寒時時有熱心 **刀可攻之** 除故至夜則愈此 况在産後安

度後中風發熱面正亦喘而頭痛竹葉陽主之。全元 是後中風發熱面正亦喘而頭痛竹葉陽主之。全元 是後中風發熱面正亦喘而頭痛竹葉陽主之。全元 是後中風發熱面正亦喘而頭痛竹葉陽主之。全元 是於温補中復令解表 而不可發汗故與此湯 日頭痛惡寒等表證不解 竹葉湯方

古十珠以水一斗煮取二升半分溫三服溫覆使 大棗 十五 大棗 枚 十五 人工经过 日子日子 寒以人参補之附子溫之面赤者竹葉清之門者枯桂枝內根防尽為汗劑治發熱頭痛然産後氣血虚 桂枝 兩 把 甘草一兩 葛根三兩 下表 兩 防風 附子 炮 一兩 枚

○郭稽中日產後榮血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令 妻氏日産後喘極危多死也 葉湯頗似小續命湯治痓加減之意病痓此節中風雖未成痓而防其有作痓之漸故竹李升墾日本篇首節云新產血虚多汗喜中風故令 梗苦以泄之甘草甘以發之 氣之上逆也 之頸項强用附子驅在經之寒邪也嘔加牛夏止邪 (東行津液以

好人乳中虚煩亂就逆安中延氣的鬼上益氣則就逆場人乳中虚煩亂就逆安中益氣竹皮大九主之。 為人乳中虚煩亂就逆安中益氣竹皮大九主之 竹皮大丸方 大溫酒吞五七九。此論足補仲景所未一兩同煮成膏和藥。此論足補仲景所未水奪命丹今烟盡谷一兩為網末好醋一多年命丹附子牛兩炮丹皮乾添碎之煮 露 15 416 4一 两 為 網 未 好 醋 一 上 熏 於 肺 亦 令 喘 急 宜 K K

辛散且入心養神入腎定志使心腎相交中虚煩亂。此産後虚熱證故用竹茹止然遊石膏淸煩亂佳枝中淋露又煩與欬皆出於肺棗肉和丸補脾土以生中淋露又煩與欬皆出於肺棗肉和丸補脾土以生中淋露又煩與欬皆出於肺棗肉和丸補脾土以生 からく しょうしょう 右五味末之 聚肉和光彈 大以飲服一 桂枝

北京東京の 濟陰綱目云中虛不可用石膏煩亂不可用桂枝此 省。 也仍飲服者尤慮夫虛虛之禍耳用是方者亦當深 方以甘草七分配聚藥六分又以聚肉為先仍以 自定矣故此方無補藥而云 徐之才日白歌惡大東而此以東內為先羞恐諸 光飲下可想其立方之微用藥之難審虛實之不易 鹹寒傷脾胃也 夫那氣去則正氣生矣故云益氣 E

在後下利虚極白頭翁加甘草阿尼湯主 益脾阿膠養血以補虛生陰也湯原治厥陰熱利下重為苦以堅腎之劑今加甘草血屬陰產後血虛下利則更傷陰分故為虛極也本 有六床以水七升煮取二升半內膠令消盡分温 葉皮各三兩 基皮 黃連 阿膠各二兩

不可輕用。不可輕用。一次此湯寒凉藥不虞其腹痛增劑乎自非仲景神明李瑋西日前節云中處此云下利處極則竹皮大丸 X

公上是以市大司各——— **婦人雜病脈證治第二十** 本篇二十一節惟有八節旁及他病其餘十三本篇二十一節惟有八節旁及他病其餘十三 本篇二十一節惟有八節旁及他病其餘十三 本篇二十一節惟有八節旁及他病其餘十三 本篇二十一節惟有八節旁及他病其餘十三 一節惟有

赤白 至此須節飲食絕慾戒怒無免牛產漏下之思 乃中衝脈有傷中衝者即陽明胃經供應胎孕。 血生於脾土故云脾稅血也胎至三月而墮 起 經候如常或七 居 失宜 一帶嚴氏謂俱由勞傷衝任風冷據於 | 脾胃虛損 店。 欲常多氣欲常少或氣 心火姜動則月經不調 赤遂成白帶若 內傷六淫外侵。 5 氣平血

婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此 回表又 帶然故病名帶下濕熱宛結不散故也則婦人帶脈貫騎上起於季脇章門穴廻身一週似家 結七疝女子帶下寢聚王註云任脈自胞上 雜病之因可緊見矣 帶下因五經脈虛結熱風滯於帶脈故女子其本皆濕熱結於帶脈故津液涌溢是謂赤 下痛陰中綿綿而下也經云任脈爲病男子 **小保命集**云赤者熱 7 7 戶液涌溢是謂赤公 肠白者熱入大腸

狀者此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈· 熱人血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯 热發作有時此血氣與邪分爭故如瘧狀而實非處虚而入之與血相搏故血結不行經水適斷以致寒 人傷寒發熱經水適來畫日明了春川讝語如見鬼 胃府為陽血室為陰畫為陽暮為陰此畫日明了 也小柴胡湯解表裏寒熱之邪謂血海是 中風七八日表邪傳襄之時經水却來表邪乘血至 電 見金三と 也版

身凉和胸肠滿如結胸狀識語者此為熱入血室也是 婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈泛 門吧其中無利期門別前不致如結胸狀故母,無出上焦。且胸脇不滿不致如結胸狀故母,則動衛氣衛且胸脇不滿不致如結胸狀故母, **造血去邪熱自除矣** 門犯其中焦氣祭氣出中焦必自愈者以經行則之 血結寒熱故勿與小柴胡湯散邪發汗 不搏陽故禁下藥傷胃氣也此雖熱入血室不似的 見鬼狀者邪熱不入府而入血室搏

外審看何? 熱入血室而裹實也期門穴在不容旁一寸五氣內陷表證罷也胸脇滿之部分。如結胸讓 直乳第二肋端肝之募也肝藏血刺期門以渴 **祭熟恶寒中風表證也因經水適 孙系傅裹之時乘虚入** 三陽日經水適監 續得寒熱發作有時羽在今長半次故用小家一勝日經水適監則血尚未盡為邪熱相搏結之 散其邪若經水適來血虚甚矣邪 經察之 實更隨其實而渴之者如 乘虚入於 血室熱除脈運身凉牙 ?來,血室空虚七八 結胸議語者 多刺 氣入之二點 (一轉音) 分上

孕則中蓄以養胎産後則上壅為乳皆此血也今別一円カストラフ」 平居水以養木。血以養肝未受孕則下行為月水紅嶽語見鬼復入膻中。 解見百則血結於胸也益婦人斷邪氣乘虚入血室血為邪绝上入肝經肝受刑則 傳入經絡與正案相摶上下流行或**遇經水**適來這 刺以馮之 許叔微日或問熱入血室何為而成結胸也日,那急 大 們說語則邪盡入裏裏有實邪泛點下故

門隨其實而渴之嚴然汗出則愈全的心意以 陽明病下血臟語者此為熱入血室但頭汗出當刺药 議語者猶太陽蓄血證之如狂善於也經云陽明 陽明經多氣多血熱入血室者血為熱與故下血也 出愈矣 超用用不想冷離到不祥奏真的此上出愈矣 而上意恨流而下到的水如果形二意由之 蒸於頭也刺期門以越其熱則血室之邪可泄而汗 或問病在陽明熱宜入府何反入於血室也日內經 法多汗今但頭汗者邪氣內結不能遍越週身但惡 痛非湯劑可及故刺期門 水散与氣面之行間、情人人水即血之同、血即水之作、不

人工 新山村大河子 婦人咽中如有炙臠牛夏厚朴湯主之全二 與衝脉其經氣原自相通故陽明有病得以熱入血質脈者起于氣衝並足陽明之經夾臍上行則陽明 室也 美地學 海街原即主淡灌谿谷與陽明合于宗筋又難經云 **云陽明者五臟六腑之海主潤宗筋衝脈者經脉之** 牛夏厚村湯方 物海豚 的 是我你是 牛夏一升 乾蘇一一兩 以此待此行出行少有和而品的国水用行而水件差失 一天 厚朴三兩 の宣記活動福品 茯苓四雨

素湯主之金下二の 婦人魔路喜悲傷欲哭象如神霊所作數久伸甘麥大 夏生姜散逆厚朴茯苓下氣蘇葉入肺經而宣正氣 婦人氣多鬱悶咽中如有炙醬諸變阻塞氣道也半 又為開節利氣之總司也 服: 右五味以水七升煮取四升分温四服口三夜一 甘草小麥大寮湯方 甘草三兩 小麥 大棗十枚

VATER OF STREET 欲哭皆陰氣愁慘之狀且申屬金肺亦屬金同氣相子生於寅秉陽氣也女子生於申秉陰氣也故悲傷 或問臟躁一證何以不病男子而獨病婦人答日男 右三珠以水六升麦取三升温分三服亦補脾氣 Males .

青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心揚主之肺痒瀉心湯燒人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫小 怪點 寒心下有水氣主小青龍湯散水行飲此病起于後處其中氣所謂氣處中滿是也而下之因作處 涎沫故先治吐以散水飲却用瀉心湯治溶此治法 本經云水在肺吐涎沫此水飲上逆也心下痞者下 求故不病男子而病婦人併不病他臟而獨病肺。

止女身在下來多程候不与冷陰掣痛少腹惡寒或引或結然中痛在開元脈數無瘡肌若魚鱗時着男子非 版虚多寒三十六病千變萬端**審脈隂陽虚實**緊弦 蘇或有憂惨悲傷多與此皆帶下非有鬼神人則羸 胺芥下根氣街氣衝急痛膝脛疼煩奄忽眩 胃狀如厥 形體損分在中盤結繞臍寒拍或兩腦疼痛與藏相連寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎墜久成肺離 婦人之病因虚積冷結氣為諸經水斷絕至有歷年

其針藥治危得安其雖同病脈各異源子當辨記勿謂 此節病以一虚字為主益因虚而致氣結 必虚 中者有氣結而在上 日婦人年五十所病下利數十日不止暮即發於六病見首篇...... 經血斷絕也故有氣結而為寒傷者有氣結而為 見水氣病。三十 經絡技部分皆因虚而得之內經云邪之 也再下來多、如崩淋失血之類。氣衝即氣街 在中在下者其種種病證各循 所奏其 因氣結

全 图 東 本 唇口乾燥故知之當以溫經湯主之多之 腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師日此病屬帶 下何以故曾經牛產瘀血在少腹不去何以知之其證 婦人年五十則已過七七之期任脈虚太衝脈衰天 陛正當少腹部分又衝脈俠臍上行故任衝脈虚則 也任主胞胎衝為血海二脈皆起於胞宫而出於會 是崩牀下血之證益血屬陰陰虚故發熱暮亦屬陰 少原裏急有亁血亦令腹滿內經云任脈爲病女子

血阻不行則陽門津液衰少不能濡潤故唇口乾燥 脈之處陰虚故掌中煩熱也陽明脈俠口環唇與衝 幣下瘕聚是也手背為陽手掌為陰乃手三陰經過 李升堅日婦人血虚津液不足者多致口乾血瘀津不布新血不生此唇口乾燥之所由生也 断以病屬带下以曾經半産少腹瘀血不去則津液 液不布者亦致口乾此際毫釐之辨須要諦審

AN AND MAN STATE 而去之此陽名温經以瘀血得温即行也方內皆補 內經云血氣者喜溫而惡寒寒則凝濫不流温則消 多及至期不來非本是主意 右十二味以水一 人少腹寒久不受胎兼取崩中去血或月水來過 桂枝育二 牡丹皮 で、大 牛夏半升 一斗奏取三并分温三服亦主婦 +----心吳茱萸

帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者土瓜根散生 主之 養氣血之樂未曾以逐縣為事而縣血自去者此養 正邪自消之法也故婦人崩牀不孕月事不調者並 1、口出去去有各口不在乳族看老力是安州是们非先在我春 右四味杵為散舞服方寸匙日三服 土瓜根 善张, 陰頻腫

虚彩虚相摶此名日華婦人則牛產漏下旋覆花湯主寸口脉弦而大弦則為滅大則為芤滅則為寒芤則為 全臣夫奉 釋義見虛勞 經自調失除瀕腫亦屬瘀血閉澁故并治之 下血閉桂枝堪氣行陽芍藥泄邪養陰則瘀血行而 带下少腹滿痛有時經水不利有時經一 達速不調者皆瘀血為患也土瓜根破瘀血塵虫 月再見行

生煦濡不絕胎可保矣葱入陽明經以安胎葢陽明下降旋覆花入肺經而降氣氣降則與血交氣血相 泉虛則上逆而不能下濟氣歸元是也血亦虛而下 血以養胎而實藉氣以生血所謂陽生則陰長也若 泄不能中守故致半產漏下葢肺主天氣位高而氣 即中衝脈為氣血之海主供應胎孕者也新絳者紅 右三味以水三升煑取一 旋覆花陽方 旋覆花三兩 茔 升頓服之。 新絲少計

之者也。 此者一主虚勞一主亡血本篇引此則耑主牛產漏李瑋西日此節本經光三見意各不同前二篇兩引 花染成用以引經活血然不竟用紅花而用紅花

須有分曉。 之則苦守而不移功能止血葢血 屬風木故入肝治血證風證如神 外用阿井水煮膠內經以濟水為

全世史界 -- 天 與血俱結在血室也大黄甘遂湯主之金三十 婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生後者此爲水 此正當血室所在也小便微難者水與血阻之 渦者非內熱也在生後見此證**自宜水血并下以** 敦大貌少腹唇肝經肝藏血滿如敦狀水血俱結在 邪養正可也 大黃甘遂湯方 刊也 問氣仍動三進並持澤波蓋,請我化何有失少成之 校主在以及水中的人的好三生五十二 八 陰 分 血 。 是. 則

婦人經水不利下抵當湯主之。 右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一 抵當湯方 大黄四兩 大黃三兩 · 重虫去型足。 廿遂_ 水蛭二十 二兩 **清急有疾血者** 亦治男子膀胱 阿膠二兩 桃仁士皮尖。 金三五

婦人經水開不利職堅辦不止中有乾血下白物攀石 之血閉溢者桃仁大黄苦以泄之 經水不刊下有瘀血也血堅乾者庭虫水蛭鹹以敢 納之。 ·物即自带白淫白医之 整石九方作用并登藏其道子心是 是以在一大人情的情景是是是是是是是是是是 右二、味来之、棕蜜爲丸如棗核大內臟中劇者再 **磐石**是分 杏仁一分 類經閉臟堅濕熱下流津

於肝也紅藍花色紅通行血脈又味辛以潤之能活液漸脫故下白物礬石味酸濇燒之則性枯燥有溢液漸脫故下白物礬石味酸濇燒之則性枯燥有溢液漸脫故下白物礬石味酸濇燒之則性枯燥有溢液漸脫故下白物礬石味酸濇燒之則性枯燥有溢於肝也紅藍花色紅通行血脈又乐辛以潤之能活於肝也紅藍花色紅通行血脈又味辛以潤之能活於肝也紅藍花色紅通行血脈又味辛以潤之能活液漸脫故下白物礬石味酸濇燒之則性枯燥有溢於肝也紅藍花色紅通行血脈又味辛以潤之能活液漸脫故下白物礬石味酸濇燒之則性枯燥有溢於肝也紅藍花色紅通行血脈又味辛以潤之能活液漸脫故下白物礬石味酸濇燒之則性枯燥有溢液

殷中諸疾痛此血虚腹痛也白术固中氣利腰腑問婦人殷中諸疾痛當歸芍藥散主之妊娠。 人が見 世文男子 でま 然所謂通則不痛痛則不通也亦主此酒願氣行血 期獨止失一是不行為人人不是是人民行氣降品血失於仍是也在無用利潤止失一是不行為人人不是是人人之為一人不知可以不是人人人人人人 血也又肝裹血其經入腹腹中刺痛乃血氣不利使 血潤原乃治風先養血血生風自滅之義酒煎以行 右一味以酒一大<u>升煎减牛頓服一</u>牛未止再服 紅監花酒方法在各分為馬夫 紅藍花一門

婦人腹中痛小建中湯主之 芍菜入脬養陰配以甘草能女脾經而止腹痛柱枝甘入脬歸其所喜所謂脬欲緩急食甘以緩之是也建者立也建中者建立脾氣也甘草膠的大聚俱味 **冷澤渴利腹中宿垢溶水以去舊生新也** 肝當歸兼入心肝脾三經皆以養臟陰而益榮血茯 血然心生血脾暴血肝臟血故用白芍入脾芎藭入。 生薑行陽散寒由是中州建立家血通行而腹痛 此中东不足而致殷痛也經云脾主中州灌溉四旁。 果而病腹別、不更再於、

しているなけれている 師日此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但 問日婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也 絕有如了泉之象此坎水不溫不能熏蒸膀胱故不了泉非與有料程此路之故只是命門火衰真陽愈 如故病不在胃也煩熱者不得溺而熱蓄於內也不得氣化而出溺也者洋流藏焉氣化則能出矣飲食 1000000

逆也盐肺主氣通調水道為腎之上源今不得溺水藏主臥與喘也又云不得臥臥則喘者長才有 小 下。 得 流壅塞肺氣不得下降故不得臥而倚息是宜利 队而倚息者一呼一 名 光· 便 滅の (主臥與喘也又)二不得臥臥則喘者是水氣之人而何息者呼吸短促氣不接續也內經三腎者 北野水 腎氣先者 也。 此以识所、化 以不用五苓散而用腎氣光也水以滋小便之源秩苓澤源俱桂附益命水以滋小便之源秩苓澤源俱桂附益命 桂附益命 則。

中此通母之氣血道監之道路也外是河車包裹內於雨腎中間着春而生有一系系於兒臍懸兒於兒 或云此主孕婦而言葢子宮即血室也一系在下上 傷胎氣者即內經妊娠用毒藥為有故無隕之義軟 手而下此共驗也果如此說則方內丹皮附子不懂 有雨岐一達於左一達於右叉胞名紫河車其帯起 不得別令收生婆以手採之畧將胞胎撞起其溺衝 合業水以養兒身合胞系了<u></u>淚則胎氣逼迎下壓勝 - Name of the second

小账滑而数者陰中即生為隆中蝕產爛者狼牙湯 婦人除寒溫中坐察蛇牀子散主之食 人子宮故可以溫中而為坐藥 **性寒子宫不溫也必有血虚腹痛經行不利不成生** 百之思蛇狀子味辛甘溫腎助陽起男子陰痿脹婦 內之自然溫木粉也 右一味末之以自粉少許和令相得如東大綿果 蛇狀子散方 蛇牀子仁

洗えんして 胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎導之見流時中上四步 一次は大日 パナント 少陰屬腎陰中腎之竅也內經二一滑者陰氣有餘叉 三 製則為熱故監中生衛館爛皆濕熱所致狼牙味 古性寒寒能勝熱苦能殺虫故主洗之 狼牙湯力等於者已坐知味能為我生在根湯不惟飲味 石一味以水四升煮取牛升以綿纏**鲂如繭浸湯**。 歷生中日四追 狼牙三馬

氣反其故道仍從大便中轉出則胃氣自不從前陰 出反從前陰竅中下泄此倒行逆施之病也指膏滑 出反從前陰竅中下泄此倒行逆施之病也指膏滑 問馬胃亂髮通瘀行滯且肺合皮毛與大腸為表裏 陰吹者胃氣自陰中吹出也正喧者陰吹之聲喧響 迫黄 · 别毛髮屬肺所士 吹喧矣

警百草列三品巴制為醫方之祖矣嗣後有 方之所宜立方以準乎理之必用君臣佐使方 劑以統之豈非醫方之大要蚊故論理以推 理未及詳與不知因病立方因方用藥昔神農 篇有治方無病因虚實未窮寒熱罕究或於賢 **周萬變而方守一隅其意有未盡也雜療方**二 內經一書但詳受病之理未及治病之方以理 制也奇偶重複方之意也內經雖未盡治病

全日 五人 物情急方 用藥各須精新先揚大黃乾薑為末研巴豆內中大黃一雨 乾薑一雨 巴豆一兩去皮心。 合治一千件用為散蜜和光亦佳密器中貯之勿 **彦茹光以雀卵飲以鮑魚汁亦方也治陽脈以** 深而備內經之遺意者數 生鐵洛治酒風以澤寫术各十分**集街五分** 之方而治皷脹以雞矢體治血枯以鳥鯛骨一 方也然則雜療方一篇仲景益酌乎病情之最

自己には一世人日子 人猝然得病欲死者皆感毒癘不正之氣而然三物 能溫中正氣夢滌邪穢或吐或下使邪氣上下分消。 誠足備 亦須折齒灌之。。 豆許三四九或不下棒頭起灌令下咽須臾當差 主心腹諸卒暴百病若中惡客作心腹脹滿卒痛 如未差更與三九當腹中鳴即吐下便差若口禁。 如錐刺氣急口噤停屍卒死者以煖水若酒服大 時急需也 3

一競虚熱四時加減柴胡飲子方 少許每帖分作三小帖每小帖以水一升煮取七溫三服如人行四五里進一服如四體壅添甘草 有各㕮咀分為三帖一 月秋月 加三加 加柴胡八 桔梗分七 原皮五 生薑五 共力貨 帖以水三升煮取二 甘草分 分五 皮子用 共八味 一升

長服訶梨勒丸方 へくてし 豆です子 所會之論非仲景神明之製也既屬虚熱用槙人無四時一定之病安得有四時一定之方此。 合溫服再合斧為一服重煮都成四服 **賃何為自屬偽方無疑** 訶梨勒性嗇厚朴破氣安可長服乎此亦偽方也。 右三味末之煉蜜光如桐子大酒飲服二十九加 訶梨勒 É 71 25 厚朴 陳皮香三 此後

排験湯方 以此二方排膿非要藥亦非仲景方也。 等採和令相得飲和服之日一服布三味杵為散取雞子黄一枚以 右凹珠以水三升煮取一升温服五合日再服。 大聚十枚 枳實十 力力 甘草二兩 芍藥六分 枚以藥散與雞黃相 一兩

仲景治傷寒三百九十七法一百十三方神而明之太一餘糧井分。太一餘糧井分。 张置 更好 治傷寒令愈不復紫石寒石散方 附子炮去 鍾乳雄煉 枯梗 紫石英 白石英 括蔞根 乾薑 **文蛤** 桂枝去皮各 防風 赤石脂

叉方 救卒死方 **医邪客氣閉塞開竅則猝然而死薤味辛而屬陽** 從鼻而出也。 肺主氣鼻爲肺竅司呼吸使外邪自鼻而進者仍令 府**陰**邪通陽氣然必搗汁溝 鼻中者以天氣通於肺。 何必用此等棄以立異乎自屬偽 **建船汁灌鼻中**。 雄雞冠割取血管吹內鼻中。

金匱要果 之可斂正祛邪內熏鼻爽氣快然名爲打之可斂正祛邪內其身人辟除不解用炭焼 **鼻中以辟客忤不正之氣** 雜於卦為異及肝俱屬風水氣化面為諸陽之會此 **雄雞屬陽冠在頂上而赤得離火正陽之色取血納** 行脂消竅而助胃氣苦酒醋也煮沸則香氣撲鼻· 大豆二七粒以雞子白并酒和盡以吞之。 雞肝及血塗面上以灰圍四旁立起。 **结脂如雞子大苦酒** 紅質酯人

救卒死而壯熱者方 華子云雞子鎮心止驚安五藏卵白能破留血和酒 氣也: 本草云大豆主殺鬼毒下瘀血散五藏結積內寒 吞之所以通陽氣而散邪氣也 **風靈鷙反能祛風也灰圍四旁立起得煖氣以固衛 塗面上以囘陽氣辟不祥內經云風氣通於肝猶病** 猝死者因中虚邪賊風使然取屬風木之雞肝及 磐石牛觔以水一斗牛煮消以漬脚令沒踝

救卒死而目閉者方 **金国要署** 穴在足心漬之叉以固先天生氣之原也獨行故卒足三陰經脈所過欲以斂陰陽之氣也且腎經湧泉之元陽漬脚沒踝脚汲即於外踝足三陽經脈所過內踝 %於耳薤汁灌耳中開心竅也皂莢末吹鼻中開肺卒死目閉氣將絕也內經云腎開竅於耳又云心開 騎牛臨面搗產汁灌耳中吹皂爽末鼻中立效 然者陽氣盡散 一卷石性味酸滴可收既散 校卒死而張口反折者方 教卒死而張口反折者方 实验之也所之条。 敷也小歲魄騎牛臨死者之面欲使牛口鼻之氣以

之欲以調和隆陽之義也心下一寸巨闕穴也臍上氣而屬陽牛禀坤順之氣而屬陰兼取二糞洗之灌 所主失便除脫也牛馬藥皆能解毒然馬禀乾健之四肢者諸陽之本四肢不收陽脫也!!便者足少隂 一寸建里穴也臍下四寸中極穴也各灸之以囘陽 升溫酒灌口中灸心下 一百狀差。 升水三斗煮取二 一手以洗之叉取牛洞 寸臍下三寸臍下

救小兒卒死而吐利不知是何病方 中而亦熱取汁灌之以溫胃氣小兒吐利卒死胃氣虚寒極矣狗性熱其尿出於胃 小兒疳虫蝕齒方 腎主骨齒者骨之餘然手足陽明經脈入上下齒中 枚點藥烙之 狗屎一 NOTE THAT THE PROPERTY OF THE 雄黃 一
た
絞
取
汁
以
灌
之
無
濕
者
水 **芦**陸 《綿果頭四五

尸跃脈動而無氣氣閉不通故靜而死也治方。澤槐乃虚星之精槐枝亦能殺虫 全面要客 不名 通肺竅心藏神開竅於舌桂心入心經着舌下以通氣閉不通而死氣逆也菖蒲屑氣味辛溫吹鼻孔以 以北之亭歷苦以泄之皆能殺虫敗毒猪脂取其潤 小兒胃中有熱則成疳病生虫而齒斷蝕爛雄黃辛 氣閉不通而死氣逆也菖蒲屑氣味辛溫吹鼻孔---**菖蒲屑內鼻兩孔中吹之令人以桂屑着舌下** が上腰首篇

五絡皆如令人身脈皆動而形無知其狀若尸赋治以厥血治關格不通陰陽原絕髮者血之餘氣味苦溫能以厥血治關格不通陰陽便絕髮者血之餘氣味苦溫能以厥血治關格不通陰陽便絕髮者血之餘氣味苦溫能以那來血不通陰陽便絕髮者血之餘氣味苦溫能 救卒死客忤死還魂湯主之方 以美酒一杯不能飲者灌之立已仲景亦 法以竹管吹其兩耳寫其左角之髮方一寸婚治。

三拘湯亦養不去質者不然亦祖此方而製之者也名所有宣氣於外杏仁利氣於內甘草緩中補虚則無所黃宣氣於外杏仁利氣於內甘草緩中補虚則無財政。 全間要 名 右三珠以水八升煮取三升去滓分令咽之通治麻黄三兩 杏仁七十個 甘草一兩 **韭根**一把 不下卷 烏 梅二七 吳茱萸华开 否

云心下若徵溫者一日已上猶可治之方。 於下也以此預占休咎誠驗。於下也以此預占休咎誠驗,以理髮取疏通陽氣之義病人櫛則病人平日之氣,也不是以理髮取疏通陽氣之義病人櫛則病人平日之氣 當言忿氣盛故也然夏時夜短於畫叉熱猶應可治又 自縊死旦至暮雖已冷必可治暮至旦小難也恐此 者生沉者死煮取三升去滓分飲之。 縊死者氛閉而絕也故摩按屈伸之 置亦弗若勞之須東可少柱湯及粥清含之令濡 其兩局手少挽其髮常弦急弦勿縱之一 陽之本 若已殖但漸漸强屈之并按其腹無可門於為諸若已殖但漸漸强屈之并按其腹陽明 采好此法最善無不活者。 **院漸漸能嚇及稍止更令兩人以兩管吹其兩耳** 按排脫上 徐徐抱解不得截绳上下安被臥之一 如此一 上房受氣數動之一人摩捋臂脛屈伸之 炊項氣從口出呼吸眼開而衛引技夢

凡中啊死不可使得冷得冷便死療之方 隔得冷便死不特冷熱格拒為患且夏月代陰在 中欲使多人溺取令溫若湯便可與之不可泥及 **車缸恐此物冷關旣在夏月得熱泥土煖車缸亦** 取令溺須得流去此謂道路窮卒無湯當令溺其 可用也 熱泥和屈草亦可扣甩椗底按及車缸以着喝 **屈草帶繞羯人腈使三兩人獨其中令溫亦可**

治馬隆及一切筋骨損方。水濕故能使水出七孔而活。。。如果以埋人則外溫衛氣而內珍 救溺死方 活。 取電中灰二石餘以埋人從頭至足水出七孔即 敗篇一握馬切為。

.樂. 凡`

禽獸焦蟲禁忌并治第一十四 供祭祀賓客燕饗之用則食味不養重乎禮見魚蟲攷之周制設官分職有庖人醢人獸人 膳膏腥冬宜鮮羽膳膏擅則四時各有其宜 素問云東方食魚嗜鹹民皆黑色疎理西方 春宜羔豚膳膏গ夏宜鯤鳙膳膏臊秋宜犢 則生不宜食則死者人盎未之察也今以禽獸 世人但知得食則生弗得則死而不知有宜

当日と日口日子日子 滋 味不可不謹也明矣 味以養於自食之有妨反能爲害自非服

肝病禁卒心病禁臟脾病禁酸肺病禁苦腎病禁甘 不因食而生有全其生須知切忌者矣所食之味有與煉液焉能不飲食乎切見時人不開調攝疾疾競起若 飲諸事病得熱更甚宜冷飲之 危例皆難療凡煮樂飲汁以解毒者雖云救急不可熱 水剋火也脾病屬土酸味屬木木剋土也肺病屬金 **苦乐屬火火剋金也腎病屬水甘味屬土土剋水也** 相宜有與身為害若得宜則經體害則成疾以此致 肝病屬水辛味屬金金尅木也心病屬火鹹味屬水

不食肝夏不食心秋不食肺冬不食腎四

諸肉不乾火炙而動見水自動者不可食之 猪肉落水浮者不可食之 足肉及肝落地不着塵土者不可食之 **秦正 医型 正文 图6** 六畜肉熱血不斷者不可食之 人物雖殊其貪生怖死之心一也既食其肉何恐復凡心皆為神識所舍勿食之使人來生復其對報矣 食其心古仁人尚有不忍食菜心者况有神識之動

为中有如朱點者不可食 父母及身本命肉食之令人神魂不安。 諸肉及無若狗不食鳥不 聚者不可食之 食肥肉及熟羹不得飲冷小 諸五藏及魚投地塵土不污者不可食之。 此以十二支所屬言惡其同一生肖也 五者皆怪誕不經必有毒故也 鳥獸不食自應有毒。

人工 五年 一五十十 下光 而 生。

食生肉飽飲乳變成白蟲地者亦感瘟疫之氣使然故食之殺人 疫死牛肉食之令病洞下亦致堅積宜利藥下之 脯藏水甕中有毒及經夏食之發腎病 則脯巴腐敗矣難經云腎色黑其臭腐以腐氣入昏米甕有濕熱鬱蒸之氣脯藏其中自能致毒及經夏 生蟲也。 毒肉留於胃中自宜下去爲安。 肉豈可生食乳酪性多濕熱邊鄙人常食之以濕熱

1、621月1日日で日子 治食變肉漏脯中毒方 治自死六畜肉中毒方 **鬱肉密器葢藏隔宿者漏脯茅屋漏下沾着者大屎飲生韭汁三升亦得** 寒勝熱舌燥濕故解其毒 瘟疫多濕熱之氣六畜感之而自死黃檗氣味苦 故食之發腎病 **黃檗屑搗服方寸七** 焼犬屎酒服方寸七 每服人乳汁亦良。 Ē

治黍米中藏乾脯食之中毒方。 冶食生肉中毒方 全国 西河 散五藏結積故也 脯藏黍米中其濕熱之氣皆足變蒸致毒大豆解毒 溫中燒之則從火化而可生胃土人乳性味甘平非 **汁辛溫去穢三物皆能解毒** 大豆濃煮汁飲數升即解亦治狸肉漏脯等毒。 清汁飲一升即愈 掘地深三尺取其下土三升以水五升煮数沸

馬 治食六畜鳥獸肝中毒方 土氣則毒氣已悉化矣三尺已上穢土也三尺已作甘故可解毒叉萬物生於土亦莫不復歸於土 脚無夜眼者不可食之 毒物入胃難以復出豆豉味苦蒸暑所成其性十 能 則得真土而純乎土性矣故煮汁飲之可以解毒。 毒索暴發惟甘味可以緩之土性緩書工土爰稼命 吐得吐則毒已解矣 水浸豆豉絞取汁服數升愈 直

食駿馬肉不飲酒則殺人形不全故勿食之喉順尸 之国此見韓非子然彼云駁馬非駁馬也姑誌之以食之不飲酒者死即飲之酒後食馬者出死力解公按秦繆公亡馬見有盗而食之者公日此駁馬肉也按秦繆公亡馬見有盗而食之者公日此駁馬肉也 野馬肉肚健難於消化不飲酒不足以運**脾**氣也食 爲同類之怒 在馬兩前足膝 毛色不 纯日 名

户馬黑頭者不可食之 食之殺人 馬鞍下肉食之殺人。 白馬青蹄者不可食之食療工食人人類 我打灰彩 馬肉不可熱食傷人心 食之火氣太盛故傷心心屬午。為少陰君火馬為午獸亦屬火心惡熱又熱 馬鞍下肉不透風氣其汗流濕漬皆能積腐成毒故

馬肝及毛不可安食中毒害人。 驢馬肉合猪肉食之成霍亂 馬肉狍肉共食醉飽臥大忌 **成霍亂** 虎鈴經日白馬青蹄皆馬毛之利害者騎之不利人。 飽队則屛氣义不運動故忌。 負之必取害也 諸肉雜食則難消化內經云飲食自倍腸胃乃

治馬肝毒中人未死方 泰盛則本氣泄故馬有肝無膽而木藏不足其肝有 成食馬肝而死葢馬為火畜肝屬木藏木能生火火 以食馬肝而死葢馬為火音肝屬木藏木能生火火 毒也誤字 漢武帝三人食馬母食馬肝赤為不知味也又漢史文 蓝

治馬肉中毒欲死方 香豉乃黑豆所製日華子云黑豆調中下氣治牛馬 酒化下並得以吐為佳 **村師方泊馬肝殺人取頭垢一** 右二味蒸一食頃熟杵之服日再服 人垢取方寸七服之佳 香豉二兩一 杏仁三兩 一分熟水調下此人垢

叉方 牛肉共猪肉食之必作寸白虫。 疫死牛或目赤或黃食之大**尼** 青牛腸不可合犬肉食之 · THE WALL 聖惠方蘆根三解馬肉毒 牛沒死者其濕熱之毒木散故目或亦或黃也 牛肉粗属難化猪肉肥濃生痰積成濕熱便能生虫。 **瘟毒杏仁下氣氛下則毒亦解矣** 者。遺根汁飲之良

蟲 牛羊猪肉皆不得以楮木桑木蒸炙食之令人腹內生 牛肺從三月至五月其中有出如馬尾割去勿食食之 之青也、水 犬肉大熱與牛腸合食則熱性但積腸中不散故戒 桑乃箕星之精古人煉藥多下桑柴火楮實子能健 然之時牛食青草胃多濕熱驅釀生蟲上入肺寂也 凡蟲類俱感濕熱之氣而生三月至五月正濕熱交

治嗽蛇牛肉食之欲死方。 人乳汁甘平能解獨肝牛肉毒。 陳藏器云黃牛獨肝者有大毒食之痢血至死北人 牛瘦多以蛇從鼻中灌之則為獨肝也水牛則無之 即生蟲乎此必物性相反有如此者 **胛消水則楮木亦可燒用何以蒸炙牛羊猪肉食之 飲人乳汁一升立愈,以泔水洗頭飲一升愈** 牛肚細切水一斗煮取一升援飲之大汗出愈

羊肉不可共生魚酪食之害人 治食牛肉中毒方 A CHILLIAN 一肉其有宿熱者不可食之 羊食毒草其肉雖溫補亦能發病故有宿熱者忌食 甘草味甘解毒。 牛肚即牛胃也人胃中受牛肉毒即以牛胃汁煖飲 之取其同類相感之意冷汗大出愈毒從毛竅中出 甘草煮汁飲之即愈: **沙**

羊蹄甲中有砾子白者各羊懸筋食之令人癫 羊肝其生椒食之破人五藏 白羊黑頭食其腦作腸癰 物故共食害人 羊肝屬木生風生椒辛熱助火其食則風火相煽故 白羊黑頭其頭異者脳必有毒以腦在頭內故也 其形不類也 魚鲊生則傷胃乳酪濕熱滯胛羊肉叉味重發病之 į

猪肉共羊肝和食之令人心悶 猪脂不可合梅子食之 猪肉和葵食之少氣。 猪肉以生胡荽同食爛人臍 A. 日本 四次以名 自相反同食爛臍者以胡荽入胛胛經入腹故胡荽芳香通竅然不可生食猪肉滯氣生痰二 猪脂滑利梅子酸滴性與相反也 羊肝水藏也性宜疏散猪肉滯氣生痰性與相及故 共食之心悶 也物性

廉脂及梅李子若妊婦食之令子青盲男子傷精· 度內不可合滿白作業食之發惡奢 **蒸菜為百茶主其心傷人衍義云葵苗性滑利不益** 人故其食則少氣 者多陽氣絕無而光明開發者少故令子青盲也男亦屬陰類妊婦三物合食則陰氣太盛而消沮閉藏人目以陰爲體以陽爲用處陰獸也梅李子味酸苦 度肉性熱源白當是浦笋性與相反故也 本草云猪肉味苦主閉血脈弱筋骨久食令人虚肥 - X

慶肉不可合鰕及生菜梅李果食之傷人 白犬自死不出舌者食之害人 痼疾人不可食能肉令終身不愈 子精氣宜溫煖陰勝則精寒本經云陰寒精自出本 自亦物性相感然也 按原辟下有二竅為夜目淮南子云孕婦見糜而四 早一一桌脂令怪矮此傷精之影也 此皆物性相反也 能性猛悍故食之發痼疾

治食犬肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱後 食狗鼠餘令人發癢瘡 人名 阿里西天河西 語如狂或洞下方 處孔竅甚多若鼠蟻所穿之穴也 た、 脈為癢留連肉腠叉古有鼠賽蟻賽之名言其腐爛 狗鼠所食餘物其涎有毒瘻瘡生兩頸旁內經云陷 大死少吐舌若中毒自死者舌不出則毒亦不散故 を

杏仁利氣氣利則毒解且犬肉畏杏仁故也亦無恙或不必過拘也 **免肉不可台白雞肉食之令人面發黃 免卯獸也雞酉禽也白雞叉純乎金色此卯酉相衝** 故合食則期胛氣而發黃 以沸湯三升和取汁分三服利下肉片大驗

凡鳥自死口不開翅不合者不可食之味又相反故合食成霍亂 死肉着較畫食之成霍亂 錫有六翮四距者不可食之 · 海奈 肉肝青者食之殺人 鳥死必開口敏翅此有毒故口閉翅張。 **見内放寒乾薑辛熟寒熱相** 其形怪者有毒瓦多月 有毒故肝青也

烏鷄白頭者不可食之。 山鷄不可合鳥獸肉食之 鷄不可各萌蒜食之清祭 相反故戒合食 林雨雪用嚴伏木棲不敢下食往往餓死雉居原野山鷄即獨雞也似雉尾長三四尺自愛其是不入叢 鸦居山最故名 鶏及胡蒜皆能生風戀疾合食滞氣風痰壅也 山鷄性食愚蟻而肉有毒與鳥獸肉 Ī 雅內久食令人獲 與屬木雉屬火故雞炙則冠變雉炙則冠紅明其性 與屬木雉屬火故雞炙則冠變雉炙則冠紅明其性 與那不可合繁內食之 時那不可合繁內食之 皆物性相反故也 皆物性相反故也 「時那不可合李子食之 「時期不可合李子食之」 「時期不可合李子食之」 「時期性相反故也 「時期性相反故也 」。 「時期性相反故也 」。 「時期也相反故也 」。 「時期也。 「時期也。 「時期也。 「時期也。」。 「時期也。 「時期也

鳥獸有中毒箭死者其肉有毒解之方 热肉勿食入水為蛟龍所噉 用書云季秋雀入大水為蛤雀不入水國多淫決以 雀性最淫物理相感如此酒叉助人淫與故妊娠忌 箭藥有射岡毒射岡即烏頭熬成者大豆汁能解烏 燕名游波能召龍所雨雷公云海揭江枯投游波而 立泛以蛟龍嗜燕故也 大豆煮汁及鹽汁服之解

魚目合者不可食之。 魚頭中無腮者不可食之殺人。 **魚頭正白如連珠至春上食之殺** 六甲日勿食鱗甲之物 無無腸膽者不可食之三年**陛不起女子絕生** A CONTRACTOR LOCAL 六甲日皆有神主之甲子神名了 已上俱形怪必有毒也。 頭毒鹽味鹹走血則毒亦解 17 17 AL 那甲戌神名 印 E E

甲申神名凌成甲午神名費陽甲辰神名王屋甲寅 無不可合雞肉食之 內經云魚者使人熱中蓋魚在水中無一息之停是 內經云魚者使人熱中蓋魚在水中無一息之停是 與水畜而性反屬火雞屬巽木而每能生風合食則 與水有熾故戒之 風水相熾故戒之 與為能入水取魚凡魚骨梗者密念鸕鷀不已即下 與為能入水取魚凡魚骨梗者密念鸕鷀不已即下

鯷魚合鹿肉生食令人筋甲縮 鲫魚不可合猴雉肉食之合者肝食 **魑魅不可合白犬血食之** 龜肉不可合酒菓子食之 鯉魚不可合犬肉食之 **青魚鮓不可合胡荽及生葵并麥醬食之** 以上七節皆物性相反故也 得合小豆藿食之其子不可合猪肝食之害

鰕無鬚及腹中通黑煮之反白者不可食之 **軽點肉不可合莧菜食之 훹無耳以目為聽純雌無雄與蛇及黿為匹目凹陷,合雞鴨子食之。屬下當** 鼈目凹陷者及靨下有王字形者不可食之其肉不得 合食則腹生鼈痕。 子相反有毒殺人。 形色 俱 異必有毒也 及腹下有王字形者皆有蠢或蛇所化也性與雞鴨

治之方。 食膾多不消結為癥病治之方。 私直皮書 **膾食之在心胸間不化吐腹不出速下除之久成癥病** 食膾飲乳酪令人腹中生蟲為痕 膾係生魚乳酪性多濕熱故合飲食則生蟲痕 大黄苦以泄滯朴消鹹以軟堅橘皮解魚毒也右三味以水一大升煮至小升頓服即消。 馬鞭草一味揚汁飲之。或以童菜汁飲之一升 橋皮一雨 大黄二兩 朴消二雨

食鯸鰊魚中毒方 食無後食黃兩種煩亂治之方。 **橘皮辛散而利氣故能解毒。** 按鯸峽河豚魚也狀如蝌蚪凡魚類目皆不賅而河 惡故其葉亦解毒 馬鞭草苦寒主癥癖血瘕破血殺蟲薑通神明去穢 蘆根煮汁服之即解 亦消 叉可服吐藥吐之 7

蟹目相向足班目赤者不可食之 食蟹中毒治之方 府子令腹脹水浸其子。」 眼令目花故有油麻子 率以三頭相從為 頭無顋身無鱗其肝毒殺人吳人言血有毒脂令舌 形異故有毒 眼睛花之語煮忌煤冶落金中蘆根能解鰈鮧毒 豚目能開閉觸物即怒腹脹浮於水上為**鶏**鶴所: 紫蘇煮汁飲之三 部其腹腴呼為西施乳腹無膽 丁揚汁飲之亦良

光蜂蠅蟲蟻等多集食上食之致瘦。 蜘蛛洛食中有毒勿食之 **凡蟹未遇霜多毒其熟者乃可食之 蟹有毒見霧則死經霜降肅殺之氣其毒始解陷隱** 紫蘇冬瓜俱解魚蟹毒。 蟲類皆穢汚有毒食之致瘻者瘻生兩頸旁正當陽 恐食中有蜘蛛絲網糞獨故也。 居日未被霜者食水莨菪故有毒 冬瓜汁飲二升食冬瓜亦可

明胃經人迎動脈處以食入於胃故也解義又見 THE TOTAL

中国水田水田 果實莱穀禁忌并治第二十 **凡沒 我 所 有 法 矣 烹 葵 斷 壺**之 沒 者 桃 日 膽 之 龍 去 其 柤 木。東京 典 **笔美以養父母** 内 **且黍豕宜稷大宜粱雁宜** 經云天食人以五氣。 地産也又經 果有核 禮云東日新之栗 食 五果寫。 果

果子落地經宿蟲蟻食之者人大忌食之 果子生食生蟲 生米停留多日有損處食之傷人 有毒生食之入胃則肌肉生產也 蟲蟻有毒故也 陽明胃經主肌肉而禀濕熱之性果子性多濕熱 然其物有不宜常食者有不宜合食者經云陰 不知所禁忌乎 之所生本在五味陰之五宮傷在五味人安可

杏酪不熟殺人 梅多食壞人齒 桃子多食令人熱仍不得入水浴令人病寒熱淋瀝病 泄故傷齒以腎主液而合骨齒者骨之餘也行義云食梅則津液泄水生水也酸肝氣以 杏酸熱有小毒杏酪不熟願之不得法也 恩與熱併不得宣散故外爲寒熱內成淋瀝 桃子性熟故多食生熟其味酸酸主收斂入水浴則 蟲鼠所嚙之餘則有損處亦有毒傷

李环酸濇能使脾氣不運而中焦壅滯故多食則吃幸不可多食令人膻脹 之。哲 林檎不可多食令人百脈弱脹膻腹也 味酸所謂水曲直作酸也肝為乙木膽為甲木人舌 李時珍日梅花開於冬而實熟於夏得木之全氣故 也 下有四竅其兩竅通膽液食梅則津生者頭相感應

樱桃杏多食傷筋骨金虾産婦氣血背宜溫和梨性寒中自宜戒食。如不可多食令人寒中金瘡産婦亦不宜食 牌主味開竅於口稿柚味酸泄液故令口爽然不知尚書注小日橋大日柚郭璞云柚似橙而大於橋蓋 稻柚多食令人口爽不知五味 全重要果 五味 而不行英脈弱 百脈宜宣還不宜產滯林榆味酸潘多食則百脈滯 100 更

· 寮性熱故令熱渴味甘故令氣脹經不生聚多食令人熱渴氣服寒熱廳瘦者彌 胡桃不可多食令人動痰飲 肺主氣氣宜利而不宜濇石榴味酸濇滯氣故損肺安石榴不可多食損人肺。 傷骨者子能令母虚水生木。 肝合筋腎合骨櫻桃杏皆味 行義云胡桃性熱發風風熱在胃疾 THE PROPERTY OF THE PROPERTY O 肌肉肌肉羸瘦者强不可食內經 元,肝,且 《飲自生。 彌不可食傷 中清滯氣故 治也

菌仰卷及色赤者不可食。 食諸果中毒治之方 木耳赤色及称生者勿食 ·新山西文 日本 之義 水畜馬火畜水可尅火也治漏脯毒者亦骨肉相感以猪骨治果子毒物性相制使然治馬肝毒者以猪 請甘走肉肉病無多食甘是也 右一味末之水服方寸七亦治馬肝漏脯等毒。 猪骨 焼過 į

誤食野芋煩亂欲死治之以前方 於主笑笑不止毒氣入心也 至楓樹萬而笑不止治之以前方 食諸菌中毒悶亂欲死治之方 吐利樂並解使毒氣上下分消也 **悶亂欲死毒氣在胃也人糞土浆大豆倶解其毒服** 南草也形色皆 異者必有毒也皆要卷 大豆濃煮汁飲之。服諸吐利藥並解人糞汁飲一升

蜀椒閉 际身體痺冷急治之方 蜀椒氣珠辛熱有毒閉口者其毒更包藏不散桂與 标皆大辛大熱之物能通血脈辟 或飮地漿 肉桂煮汁飲之 多飲谷水一二 於肺煩亂欲死毒氣 口者有毒誤食之戟人咽喉氣病欲絕或吐 成野 **)義也令木以** ĺ 或濃煮豉汁飲之 並解。 野芋根

二月勿食藝傷人腎。 正月勿食然令人面生游風。 辛散故傷腎也主令水能生水正腎水泄氣之時以腎主閉藏整味文選云習整蟲之总辛是物莫辛於藝也二月卯木 **慈過於發散故面生游風 慈味辛散入陽明經陽明循頭面** 以吐去其毒 本乎也亦莫不復歸於也見也則毒已 三之宫也是今你名元荽是也。荽音谷、则助陽氣八月則散陰氣非其宜也然夏屬心火心則助陽氣八月則散陰氣非其宜也然夏屬心火心則助陽氣及月則散陰氣非其宜也然夏屬心火心。 四月八月勿食胡荽傷人神 熱之物以助之則陽邊盛而傷陰經云腎藏精與蒜味辛熟辛走氣熱傷氣三月陽氣已盛又食此 傷志性即傷腎之義

五月五日天中節乃純陽之日也生菜冷利不益腸加之也韭氣味辛溫五月食之但益已盛之陽不為加之也韭氣味辛溫五月食之但益已盛之陽不為 六月七月勿食茱萸傷神氣。 五月勿食韭令人乏氣方 六月暑氣盛張七月微陰將斂吳茱萸辛熱走氣 胃反泄陽氣故食之發病

八月九月勿食題傷人神 人工學門 图》 日本 - 月勿食椒損人心傷人脈 月勿食被霜生菜人 八九月神氣收敛之時蓋味過於辛散故食之傷神 氣熱·心惡執族食之損心并傷脈者. 飲故傷神氣也 月陽氣盡敏氣主閉藏椒乃玉衡星精味辛散 に送い 一氣食之使心火太張肺金 面無光月雄 巨

皆不可用深宜慎之 四季勿食生裝令人飲食不化發百病非但食中學 十一二月疑寒閉藏之候薤氣珠辛散大走肺氣故 之飲食不化而發病 **脾屬土土寄旺於四時之季月生葵滑利傷脾故食** 食之多涕睡也 而寒滑更甚故食之致此等疾 月十二月勿食薤令人多涕嘘 月純陰無陽故爲陽月嚴霜 一般之気生芽被グ

胖主四肢生菜滑利傷胖故手足腫**也病愈為差** 粉病差未健食生菜手足必腫 小豆匠 更好 夜食生茶不利人 飲白酒食生韭令人病增 **葱韭初生芽者食之傷人心氣** 於去 氣。 慈莊初生芽則純陽虧勃之氣尚未透察故食傷心 生菜傷脾夜臥脬氣不運故也。 アホル

生慈和雄雞雉白犬肉食之令人七竅經年流血 聚合生态食之令人病 夜食諸薑葱蒜等。傷人心 食糖蜜後四日內食生憑非令人心痛 生葱不可其蜜食之殺人獨顆蒜彌甚 怒韭聚盛皆性相反者獨顆蒜有毒。 此皆生風努火之物合食則血氣更掉溢不和故七 白酒多混生韭性熱濕熱相合自今病增 寂流血

验不可其牛肉作美食之成痰病韭亦然 萬多食動痔病 無青根多食令人氣脹 いっぱいけいり **萼性滑而有毒動痔病** 之傷心者以神氣不滅也 **諸薑葱蒜皆無味辛散之物夜氣收飲不宜辛散食** 者故合食則積而成瘕 衍義三無青即蔓青也根過食動氣 肉粗属難以尅化強韭氣味臭烈皆脾家所

黄爪食之發熱病 葵心不可食傷人葉尤為黄背赤莖者勿食之月令仲夏王派生今俗稱黃瓜以色名也有毒 白苣不可共酪同食作騷蟲 野苣不可同蜜食之作內痔 白苣苦寒乳酪甘熱氣味乖反故合食生蟲 菜心有毒黃背赤莖者葉色反常故亦有毒 而內寫血者是也 苦一甘性味相反經云腸游爲痔內痔則外

芋不可多食動氣。 胡妾久食之令人多忘 妊娠食薑令子傑指。 病人不可食胡荽及黃花菜 に見れば大力 胡安辛溫開竅八心脾一 胡芬辛溫耗氣黃花菜苦寒傷胃皆病人所忌者 餘指手多生一 智久食過於辛散故多於 ·性滞而發病多食則胸腹脹悶故動氣 The alka 指也普 一經心滅神脾主思藏意 in the

寥多食發心病。蓼和生魚食之令人毒氣、陰核疼痛。 蓼珠辛溫有毒生魚。 多食發心病熱傷氣故合食則奪氣也陰核痛亦濕 然致病耳 二物亦性相反者 一二物亦性相反者 辛熟耗氣故也 辛熟耗氣故也 食蹊或躁方主躁

鉤吻與芹菜相似食之殺人解之方 1111年111日 與毒藥共處而毒 **性之精名日鉤吻入** 黄帝問天老日天地所生有食之死者乎天老日太 尼根並似人参而某小異味甘 豉苦而能吐毒隨吐解也 右 鼓濃煮汁飲之 味水六升煮取二 八雨 口則死無他真莖上有毛。 升分溫 服

春秋 来中有水頂岩柴圓而光有毒誤食之令人狂亂狀如 **股滿痛不可忍名蛟龍病治之方。** 中風或吐血治之方 龍性淫而能受化交不擇類故有帶精入芹菜中之 甘以緩之故能解毒。 。 甘草煮汁服之即解 時能帶精入芹菜中 硬糖! 味,日兩度服之吐出如蜥蜴三五枚差 17 TA 、偶食之為病發時手背

扁豆寒热者不可食之 食苦瓠中毒治之方。 地震、泰福米 寒熱者傷寒病也扁豆實脾而性稍滯故勿食。 種瓠之家不燒穣物性相畏也故黍穰能解 按風俗通云燒穰可以殺瓠又云種瓜之家不燒漆 **時硬糖味甘甘能解毒故也 漆穰煮汁敷服之解** 八枯燥 The man

白黍水不可同能蜜食亦不可合葵食之 食大豆屑忌噉猪肉 大麥久食令人作癖。 云諸痛癢瘡皆屬心火故作癖字 東云癬疹同葢麥入心久食則, 黍米多熱令人心煩餡蜜味甘令人中滿故戒同食 食療云此二物小兒不得合食必壅氣致死十歲尸 小豆科小便參律液故久食則肌膚枯燥。 者不忌。 心氣盛而內熱經

食髮落即脫鬚眉之意也益髮者血之餘動風則血 沒得有麵今以臆斷之故與蕎同音古字通用即為 沒有紫紋據此二說觀之則敢乃草花之類非麥也 爾雅云一名錦葵春時開花葉未生花似五銖錢粉 疾物性相反如此 詩經陳風篇云視爾如收翹註收此才也又名 **葵菜為百來主其心傷人食療云黍米合葵食成点**

既多食傷人肺 **参物** 一手足陽明經脈入上下齒中其性喜溫惡寒故忌食 食令物水人齒 以熱物勿飲冷水 省世 二 髮落以此知敢即器也然亦未敢自信站存疑以 烧髮枯而落經云風傷皮毛是毛髮原同一類故 一類故令

夏月大醉汗流不得令水洗着身及心故作心痛。 飲酒大醉灸腹背令人腸結。 Act will mit and 飲酒食生養耳令人心痛 夏月醉汗腠理已開叉浴水使扇是風濕相搏成病 漏風可不謹哉。 本經云汗出浴水則為黃汗內經云飲酒中風謂之 菜味苦有毒復食酒以行其毒非所宜也苦入 胃乃傷。 41.24 《使扇即成病 Ĩ

食的多飲酒大忌 飲酒食猪肉臥秫稻穰中則<u>聚黄</u> 醉後勿飽食發寒熱 怡然也能味甘經云酒客不喜甘故也故酒與能相劉熈日饒之稠者日傷强硬如錫也清者日能形怡 黃者濕熱交蒸所致飲酒食肉則濕熱聚於中臥秋 稻穣中則濕熱因於外故發黃 因醉飽而發寒熱胃氣大傷筋脈横解也 醉後血氣淖益復以火廹之火燥血枯 グニス **此灾異也故戒勿飲 光酒及水照見人影動者不可飲之** 巴心

飲食中毒煩滿之方 毒其角解毒以之為節攬飲食沫出及以飲食荒地超朴子云犀食百草之毒及衆木之棘故知飲食之年 角筋攪飲食沫出及澆地墳起者食之殺人 甘味滿於中鹹味涌於上甜粥已食鹽即吐 苦参三 苦酒 味者三沸三上三下服之吐食出即差 一升牛 一自應即吐

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方。 全肚夹 先受之故解 切諸毒 李時珍日犀角入胃經胃為水穀之海飲食柴物胃 **苦参味苦苦酒味酸內經云酸苦涌泄為陰涌吐也** 吐去其毒煩滿自消矣 右一味以水三升煮冷鹽消分三服當吐出食便 犀角湯亦佳。 鹽土升 T

商陸以水服稅 葶藶子傳頭瘡藥氣入腦殺人。 商陸有毒能行、而性又惡水 頭為諸陽之會腦為髓海先天性命根也等盤子味 誠味 軟堅又能涌泄今人常用鹽湯採吐即潤此法 而性又惡水故也

这段更 苦楝無子者殺人 水銀入人耳及六畜等皆死以金銀着耳邊水銀則吐 唐本注云棟有雖在兩種雖者根白有子可服雄者 吐者此物性感召之理循磁石之引針也盡故死人然其為物自是金銀之類金銀着耳邃則。 根赤無子有毒服之吐不止有至死者。 唐本注云水銀入肉使百脈寧縮入耳能令食腦至 **节大寒雖能敷瘡殺蟲然藥氣入腦則瘡毒亦內攻** / 脳矣故殺人

通除諸毒藥 無知謂不知其毒而誤食之也假借也毒解見前 語毒多是很毒以投無知時宜煮<u>齊</u>花甘草汁飲之